ANAMED™ WB SP0.1

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Spinosad ..... 1.2 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA Nº. 3655 - SENASA

Titular de Registro:
ISCA TECHNOLOGIES S.A.C.
Jr. El Cascajal Nro. 144 Urb. Las Lomas de Monterrico - Santiago de Surco.
Lima - Perú Telf.: (+51) 966 424 848

Formulador:
ISCA TECHNOLOGIES, INC.
1230 W. Spring Street Riverside, CA 92507. EE.UU

Importador y Distribuidor:
AG TEN E.I.R.L.
Urb. Laguna de Chipe II 3 Mz A Lote 5.
Piura - Perú

10 Litros

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- ATENCIÓN Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga pantalón largo botas visor tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el medico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto específico

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

SAMU: 106 - ISCA TECHNOLOGIES S.A.C.: 966 424 848

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin .
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- ”Toxico para abejas”.
- ”Toxico para organismos acuáticos”.
- ”No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- ”Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros”.
- ”Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre” “No permitir animales en el area tratada”.
- ”El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- ”El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- ”En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANAMED™ WB SP 0.1 es una formulación de atraer-y-matar para el manejo de la mosca de la fruta tefrítidas y otras plagas que responden a **ANAMED™ WB SP 0.1**. El atrayente alimentario en **ANAMED™ WB SP 0.1** hará que las moscas de la fruta machos y hembras ingieran el insecticida que conducirá a la mortalidad.

ANAMED™ WB SP0.1 se prepara diluyendo **ANAMED™ WB SP 0.1** con agua limpia de acuerdo con las instrucciones en la sección de dosis de aplicación. puede aplicarse con un pulverizador de mochila, equipo de pulverización mecánica terrestre. Use el producto dentro de las 24 horas después de mezclarlo con agua.

Apunte **ANAMED™ WB SP 0.1** al tronco del árbol o al centro del follaje de la planta. Aplique **ANAMED™ WB SP 0.1** en forma de gotas de 4 mm de diámetro o más para optimizar la vida útil del producto. La decoloración localizada puede ocurrir cuando **ANAMED™ WB SP 0.1** se aplica directamente a las frutas u hojas. Esto no dañará la planta.

EVITE LA APLICACIÓN DIRECTA SOBRE LAS FRUTAS. Evite la aplicación durante las horas más calurosas del día. Para obtener los mejores resultados, recoja y retire regularmente la fruta caída del área. La eliminación de la fruta del suelo reduce la competencia de fuentes alternativas de alimentos con **ANAMED™ WB SP 0.1** y mejora el rendimiento del producto. El rendimiento puede medirse evaluando el daño a los cultivos utilizando métodos conocidos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Mosca mediterránea de la fruta	*Ceratitis capitata*	1	14	0.5
Mandarina	Mosca mediterránea de la fruta	*Ceratitis capitata*	1	1	0.3
Palto	Mosca mediterránea de la fruta	*Ceratitis capitata*	1	1	0.3
Mango	Mosca de la fruta	*Anastrepha fraterculus*	1	1	0.02
	Mosca mediterránea de la fruta	*Ceratitis capitata*			

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Vuelva a aplicar **ANAMED™ WB SP 0.1** basado en datos de monitoreo o al menos cada 2 a 3 semanas. Utilice intervalos más cortos en la maduración de la fruta. **ANAMED™ WB SP 0.1** tiene propiedades de resistencia a la intemperie y puede soportar eventos de lluvia leve. Volver a aplicar el producto después de eventos de lluvias moderadas. En ambientes constantemente lluviosos o zonas de riego se recomienda acortar los intervalos de aplicación. El producto puede lavarse si se aplica menos de 8h antes de un evento de lluvia. No aplicar sobre superficies mojadas.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda utilizar solo, sin mezclar con otros productos

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO