

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MUSTANG®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato	50 g/Kg
Lufenuron	100 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 3517 - SENASA

Titular de Registro, importador y distribuidor:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono: (01) 348-1018



Formulado por:

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. LTD.

Wanshi Town Yixing City Jiangsu

Province China 214217 China

Teléfono: 86-510-87851001

Fax: 86-510-8444153



CONTENIDO NETO: 250 g

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:

Noctivo en caso de ingestión

Noctivo en contacto con la piel

Noctivo si se inhala

Causa irritación moderada a los ojos

Muy tóxico para organismos acuáticos



ATENCIÓN

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico, no ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiarse la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano o animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: AVERMECTINA + BENZOYLUREA
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto. No dejar solo al intoxicado.
- En caso de ingestión, nunca dar nada de tomar a una persona inconsciente. Mantener al paciente en reposo. No inducir al vómito. Buscar atención médica.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el pelo y debajo de las uñas. Si se desarrollan síntomas de intoxicación, trasladar al paciente a un centro de salud para el tratamiento. Consultar a un médico inmediatamente.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 a 20 minutos y consultar a un médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Mantener en reposo. Buscar asesoramiento médico.
- ANTIDOTO: No hay un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106; POINT ANDINA S.A. (01) 348 1018

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa conteniendo. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas. No aplicar en floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos o con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.1	0.5	20	0.01 (1) 0.02 (2)

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). (1) Emamectin benzoato; (2) Lufenuron

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MUSTANG® es un poderoso insecticida que actúa por ingestión, con un ligero efecto de contacto, contiene Emamectin benzoato, insecticida con un marcado efecto translinar, el cual genera depósitos de emamectin en el mesófilo de las hojas aplicadas, este insecticida al ser ingerido actúa sobre dos receptores post sinápticos generando un flujo constante de iones cloro afectando el sistema neuromuscular del insecto.

MUSTANG® también contiene Lufenuron, ingrediente activo altamente lipofílico que le confiere una gran persistencia sobre la superficie foliar, este insecticida actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la muda del insecto.

MUSTANG® por su alta residualidad y sus dos ingredientes activos es un producto muy eficaz para ser empleado en cualquier programa de manejo integrado de lepidópteros. Aplicar con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

MUSTANG® se aplica como máximo dos veces por temporada de cultivo. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD:

MUSTANG® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

MUSTANG® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para o fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

