VERLAQ® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectina..... 18 g/l
Aditivos ..... 982 g/l

PQUA N° 777-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
AGRIPAC PERÚ S.A.C.®
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663

FORMULADO POR:
HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD
No 6, Huagong Middle Road, Circulation
Chemical Industry Park, Shijiazhuang, Hebei
China
Teléfono: 86(0) 311 85915988

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
AGRIPAC PERÚ S.A.C.®
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663

Agripac®

Agripac Perú S.A.C.

Contenido Neto: 20 litros

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto puede ser mortal si se ingiere (CL50 oral en ratas: 812 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular.
- El ingrediente abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico:** Avermectina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos, si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria y si existe practicar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a : **EN CASO DE EMERGENCIA LLAME A CICOTOX: 0800 – 1300 –CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801 – 10200.**

Nota al médico: Verlaq® 1.8 EC no tiene antídoto. Tratar sintomáticamente.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo,
- triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Verlaq® 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de usos. El equipo a utilizarse en la aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar, considerando que su acción es por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (l/Cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	"Mosca blanca" "Ácaro hialino"	*Liriomyza huidobrensis* *Polyphagotarsonemus latus*	0.1 0.150	15	0.01
Mandarina	"Minadora de hoja"	*Phyllocnistis citrella*	0.1	15	0.01
Naranja	"Ácaro tostador"	*Phyllocoptura oleivora*	0.1	15	0.01
Fresa	"Arañita roja"	*Tetranychus cinnabarinus*	0.1 0.15	15	0.02
Apio	"Mosca minadora "Ácaro hialino"	*Liriomyza huidobrensis* *Polyphagotarsonemus latus*	0.1 0.15	15	0.01
Clavel	"Arañita roja"	*Tetranychus cinnabarinus*	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	0.20 0.30	15	0.01
Paprika	"Ácaro hialino"	*Polyphagotarsonemus latus*	0.20 0.40	15	0.2
Vid	"Araña roja"	*Tetranychus urticae*	0.2	28	0.01

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos. **Verlaq® 1.8 EC** debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadíos larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERIÓDO DE REENTRADA (REINGRESO): No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Verlaq® 1.8 EC puede ser mezclado con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: Verlaq® 1.8 EC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA