

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (CL50 oral en ratas: 812 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Este producto causa daño temporal a los ojos. Evite la exposición ocular.
- El ingrediente abamectina puede causar daños al feto. Evite la exposición de gestantes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico:** Avermectina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante al menos 15 minutos, si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria y si existe practicar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a : **EN CASO DE EMERGENCIA LLAME A CICOTOX: 0800 – 1300 –CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 0801 – 10200.**

Nota al médico: Verlaq® 1.8 EC no tiene antidoto. Tratar sintomáticamente.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo.
- Triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar.

VERLAQ® 1.8 EC

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectina..... 18 g/l
Aditivos 982 g/l

PQUA N° 777-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.®
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663

FORMULADO POR:

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO., LTD
No 6, Huagong Middle Road, Circulation Chemical
Industry Park, Shijiazhuang, Hebei
China
Teléfono: 86(0) 311 85915988

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ S.A.C.®
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663



Agripac Perú S.A.C.

Contenido Neto: 200 litros

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Verlaq® 1.8 EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de usos. El equipo a utilizarse en la aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar, considerando que su acción es por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (l/Cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa	"Mosca blanca"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1 0.150	15	0.01
	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>			
Mandarina	"Minadora de hoja"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	15	0.01
Naranja	"Acaro tostador"	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	0.1	15	0.01
Fresa	"Araña roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.1 0.15	15	0.02
Apio	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1 0.15	15	0.01
	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>			
Clavel	"Araña roja"	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.15	15	0.01
Alcachofa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.20 0.30	15	0.01
Paprika	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.20 0.40	15	0.2
Vid	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2	28	0.01

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para todos los cultivos. Verlaq® 1.8 EC debe aplicarse tan pronto como se observen los primeros estadios larvales o ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Verlaq® 1.8 EC puede ser mezclado con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: Verlaq® 1.8 EC aplicado de acuerdo a las indicaciones que se dan no presenta problemas de fitotoxicidad en los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

