

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino no ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- Causa daño irreversible a los ojos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Evite el contacto con la piel y las mucosas. Puede causar irritación a los ojos.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Imidazole
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CISPROQUIM: 0800-50847;
POINT ANDINA S.A. (01) 348- 1018 ó 349-9609

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS: • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir a animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SIN NOMBRE COMERCIAL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Imazalil 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro, importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA Ltd**

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sin nombre comercial es un moderno fungicida sistémico, efectivo para el control de hongos como Fusarium y Mildiú y para tratamiento post cosecha en frutos.

Sin nombre comercial penetra muy fácilmente dentro de los tejidos de la planta permitiendo un control efectivo sobre los hongos.

Sin nombre comercial se emplea también para la desinfección de semillas, camas de almacigo o campo definitivo.

Sin nombre comercial debe aplicarse a los primeros síntomas de la enfermedad, la aplicación debe ser dirigida al pie de planta realizando una buena cobertura.

Sin nombre comercial se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS ml/200L | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| Espárgano | Chupadera fungosa | <i>Fusarium moniliforme</i> | 200 | 7 | 0.05 |
| Té | Marchitez | <i>Fusarium oxysporum</i> | 200 | 5 | 0.1 |
| Rosas | Mildiú | <i>Peronospora sparsa</i> | 150 - 200 | N.A. | N.A. |
| Vid | Muerte regresiva | <i>Lasioidiplodia theobromae</i> | 300 | 71 | 0.05 |

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:

| | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|
| Cebada | Fusarium | <i>Fusarium graminearum</i> | 2-4 ml/kg de semilla | N.D. | 0.05 |
| | Helminthosporium | <i>Helminthosporium sativum</i> | 2-4 ml/kg de semilla | N.D. | 0.05 |

POST COSECHA:

| | | | | | |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|------|---|
| Mandarina | Moho verde | <i>Penicillium digitatum</i> | 0.4 - 0.6 % | N.A. | 5 |
|-----------|------------|------------------------------|-------------|------|---|

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.D.: No disponible N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al momento de siembra y al trasplante del cultivo.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas por año. En el cultivo de vid se recomienda 1 aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: **Sin nombre comercial** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

