

14,5 ± 0,3

 $1,0 \pm 0,3$ 

## 2.2



- 



- 

A

U

Im  
C

- Importado y  
Contenido M

Neto 4 L

- do por: A

**GRO UNIT**

## WEEK CROPS

SCIENCE S

**S.A.C.**

**COMPATIBILIDAD**  
Se puede  
compatibilizar

**FITOTOXICIDAD**  
No se ha ob-

**BILIDAD**  
emplear en  
idad previa.

**CIDAD**  
bservado sín

mezcla con

tomos de fito

los plaguicidas  
toxicidad, de

das agrícola

s más comu

ajas concentr

nes, excepto

raciones emp

pleadas.

cción alcalin

a. Es recom

endable effects

ctuar una pr

prueba de

---

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**K-CIQUE** es un fungicida sistémico y de contacto.

**K-CIQUE** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**P. C.:** Periodo de Carencia      **LMR:** Límite Máximo Residuos

Realizar 1 aplicación por campaña por año y en época de brotamiento, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad  
Realizar aplicaciones preventivas, procurando una buena cobertura del follaje.

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Envase PEAD