

31,2 ± 0,3

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Nombre comercial del producto: **TODYM**

Nombre común: **AZOXYSTROBIN + TEBUCONAZOLE**

Clase: **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Reg. **PQUA N° XXXX - SENASA**

Composición:

Azoxystrobin ..... 250 g/Kg

Tebuconazole ..... 500 g/Kg


Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Fórmula empírica ; **Peso molecular:**

Azoxystrobin: C<sub>22</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>O<sub>5</sub> ; 403.5 g/mol

Tebuconazole: C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>O ; 307.8 g/mol

Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO

- Apariencia: Gránulos dispersables
- Color: Blanquecino
- Olor: Ligero
- Estabilidad en almacenamiento: **TODYM** es estable bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original sellado hasta por 2 años.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original. Etiquetado y cerrado.

- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado. Nunca junto a alimentos, bebidas, medicinas o forrajes.
- No usar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Estrobilurina + Triazol**
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito sin supervisión médica, ni dar agua a la persona si está inconsciente o convulsiona.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106

AGRO UNITEK CROPS SCIENCE S.A.C.: 961925844

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**TODYM** es un fungicida sistémico con acción preventiva y protectora cuyos ingredientes activos tienen mecanismos de acción complementaria, el azoxystrobin inhibe la germinación de la esporas y crecimiento micelial mientras que el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol esencial para la formación de las membranas celulares del hongo, lo que conlleva a sus muerte.

**TODYM** se emplea en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua hasta completar el volumen requerido y lograr una mezcla homogénea. Aplicar con equipo en buen estado y debidamente calibrado, usando boquillas de cono hueco que produzcan gotas finas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia y severidad de la enfermedad y las condiciones óptimas de desarrollo de estas, para proceder a la aplicación de **TODYM**. Se recomienda como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. La dosis máxima a aplicar es de 0.3 Kg/ha. De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente modo de acción.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA            |                               | DOSIS |        | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)    |
|-----------|------------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|
|           | NOMBRE COMÚN     | NOMBRE CIENTÍFICO             | Kg/ha | Kg/cil |              |                 |
| ESPÁRRAGO | "Mancha púrpura" | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 0.3   | -      | 40           | *0.04<br>**0.05 |
| CAFÉ      | "Roya Amarilla"  | <i>Hemileia vastatrix</i>     | -     | 0.2    | 30           | *0.03<br>**0.15 |
| VIT       | "Oidium"         | <i>Erysiphe necator</i>       | 0.25  | -      | 14           | *3<br>**0.5     |

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos  
\*LMR Azoxystrobin \*\*LMR Tebuconazole

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

**TODYM** es incompatible con agentes oxidantes. En caso de duda, hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**TODYM**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Titular de Registro: **AGRO UNITEK CROPS SCIENCE S.A.C.**  
Av. Juan de Aliaga Urb. Orrantía del Mar 355  
Magdalena del Mar, Lima  
Telf.: 961925844



Formulado por: **JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**  
N° 7 Huanyang East Road,  
Jixi County, Anhui Province, China.

Importado y  
Distribuido por: **AGRO UNITEK CROPS SCIENCE S.A.C.**



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO