

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Julietta®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN

Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02 960.8 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Registro N° XXXX-SENASA-PBA



Titular del Registro,
Importado y Distribuido por:
**SUMMIT AGRO SOUTH
AMERICA SPA, SUCURSAL PERU**
Calle Coronel Andrés Reyes N° 360
Of. 401-A San Isidro, Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096



Formulado por:
AGRAUXINE S.A.
137 rue Gabriel Péri, 93700
Marcq en Baroeul, Francia

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : 10 Kg
Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarera y guantes".
- "Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón".
- "Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación".
- "No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos".
- "No almacenar en casas de habitación".
- "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua y consulte a un médico si se presentan trastornos.
- En caso de contacto con la piel: Lave con agua y jabón y enjuague bien. El contacto con la piel no es peligroso según nuestro conocimiento. Consulte a un médico si se produce irritación o sintoma adverso.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con agua manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte a un oftalmólogo si la irritación persiste.
- En caso de inhalación: traslade al paciente de la zona de exposición. Consulte a un médico si se producen trastornos.
- Antídoto: No posee antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA,
SUCURSAL PERU: (511) 444-3096

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoja el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto, desechos o envases vacíos.
- No contaminar arroyos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los residuos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JULIETTA® es un fungicida que actúa a través de la competencia por el espacio y nutrientes con los patógenos. Su principio activo la levadura de *Saccharomyces cerevisiae* cepa LAS 02 coloniza el ambiente antes que los hongos evitando que estos puedan crecer en los tejidos vegetales.

- Preparación de la mezcla: Agite el envase antes de usarlo. Llene el estanque, completando la capacidad de agua que va a utilizar con el plaguicida. Una vez que la mezcla esté homogénea, añadir al último la cantidad necesaria de **JULIETTA®** con el agitador en marcha. Lave cuidadosamente el equipo de aplicación una vez terminada la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones previa evaluación, de 2 a 6 veces con un intervalo de 5 a 7 días y 1 campaña al año.

- Para *Botrytis cinerea*: cuando se presenten las condiciones para el desarrollo del hongo o al inicio de la infestación, desde las etapas fenológicas de floración a desarrollo de frutos.

- Para *Acetobacter acetii*: al inicio de la madurez de bayas con baja incidencia.

PERÍODO DE REINGRESO

Debido a las propiedades toxicológicas favorables de **JULIETTA®** no se requiere un período de reingreso. En caso de actividades posteriores a la aplicación en las que pueda ocurrir contacto con los cultivos tratados, se debe usar el equipo de protección personal adecuado.

COMPATIBILIDAD

Compatible con los productos químicos: polvo de hierro, xileno, solución de fosfato de amonio, solución de permanganato de potasio. En caso de dudas, realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar en el equipo aplicador.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en el cultivo y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2 - 2.5	N.A.	N.A.
	Pudrición ácida	<i>Acetobacter acetii</i>	2 - 2.5	N.A.	N.A.
Aarándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.5	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenza (días)

N.A.: No aplica

