

285.00 mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos y piel.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo: Fitohormonas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente, no provoque el vómito.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco, mantenerlo en reposo y vigilar su respiración.
- Si entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por un período de 20 minutos, tratando de abrir los párpados ocasionalmente.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Todo tratamiento debe ser sintomático
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

SAMU: 106
CISPROQUIM: 080-050-847
UPL PERÚ S.A.C.: (511) 611-0831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TIRATOR®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Citoquininas 2.047 g/L
Aditivos c.s.p..... 1 L

RCP N° - SENASA

Titular de registro:

UPL PERÚ S.A.C.
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague
Jesús María, Lima - Perú

Formulador:

Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey Km. 15.5
C.P. 25900. Ramos Arizpe Coahuila, México



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 L
Fecha de vencimiento:

© Marca Registrada de UPL

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TIRATOR® es un regulador de crecimiento de plantas que estimula el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Promueve la división celular y la actividad de las hormonas lo que repercute en el mejor rendimiento de los frutos.

TIRATOR® se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad; y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea y viértala al tanque de aplicación; complete el volumen de agua a utilizar.

TIRATOR® puede ser aplicado con diversos equipos utilizados para aplicación foliar (pulverizadores manuales de palanca, motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (L/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Arándano	1era aplicación: en la etapa de Floración (30% de flores abiertas)	0.25	N.A.	N.A.
Palto	2da aplicación: en la etapa de cuajado de fruto	0.3	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos P.C. Periodo de carencia N.A.: No aplica

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos de reacción altamente alcalina. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico para los cultivos recomendados, no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**PRECAUCIÓN**

150.00 mm