

285.00 mm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos y piel.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar envases vacíos para almacenar alimentos, ni bebidas.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo: Fitohormonas
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente, no provoque el vómito.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco, mantenerlo en reposo y vigilar su respiración.
- Si entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por un período de 20 minutos, tratando de abrir los párpados ocasionalmente.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Todo tratamiento debe ser sintomático
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

**SAMU: 106**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**  
**UPL PERÚ S.A.C.: (511) 611-0831**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# TIRATOR®

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**Composición:**

Citoquininas.....2.047 g/L  
Aditivos c.s.p.....1 L

**Reg. RCP N° 136 - SENASA**

**Titular de registro:**

**UPL PERÚ S.A.C.**  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Fnd. Oyague  
Jesús María, Lima - Perú

**Formulador:**

**Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C.V.**  
Carretera Saltillo-Monterrey Km. 15.5  
C.P. 25900. Ramos Arizpe Coahuila, México



Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: **1 L**  
Fecha de vencimiento:

® Marca Registrada de UPL

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TIRATOR®** es un regulador de crecimiento de plantas que estimula el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Promueve la división celular y la actividad de las hormonas lo que repercute en el mejor rendimiento de los frutos.

**TIRATOR®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad, y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea y viértala al tanque de aplicación; complete el volumen de agua a utilizar.

**TIRATOR®** puede ser aplicado con diversos equipos utilizados para aplicación foliar (pulverizadores manuales de palanca, motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores).

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS (L/200 L)	DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Arándano	1era aplicación: en la etapa de Floración (30% de flores abiertas)	0.25	-	N.A.	N.A.
Palto	2da aplicación: en la etapa de cuajado de fruto	0.3	-	N.A.	N.A.
Vid	1era aplicación: Etapa fenológica de inicio de crecimiento de baya a 5 mm del calibre. 2da aplicación: 7 días después	-	1.0 - 1.25	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos

P.C. Periodo de carencia

N.A.: No aplica

**PERIODO DE REINGRESO**

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos de reacción altamente alcalina. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados, no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**



150.00 mm