$0.7 \pm 0.2$  $0.3 \pm 0.2$ 

# "LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN Este producto es de cuidado, no ingerir. No comer, no beber nifumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar este producto e na uenvase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua

- y jabón.

  Este producto puede ser mortal si se ingiere.

  Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación; y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

  Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

  No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.

  Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

  Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

  Grupo Químico: Fermentación de la bacteria Saccharopolyspora spinosa.

  En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

  En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.

  En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por aproximadamente 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y iabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista

dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial

Antídoto: no existe antídoto específico. TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 NEXXT S A C: (01) 326-1910

# CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

CONDICIONES DE MANEJOY DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASE.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usa el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicio frituriando lo perforiandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

  Peligroso para abejas u tors artópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

  Peligroso para organismos acuáticos.

  No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.

  No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.

  No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación no sobrantes del producto.

  Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al emeco 80 metros.

  Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. Mantenga a los animales fuera del las zonas tratadas después de la aplicación.

  El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

  En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



# PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:	
Spinosad	120 g/L
Aditivos c	.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: INHAS S.A.C. Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO., LTD.

N° 7 Huanyang East Road, Jixi County

Anhui Province - China.

Importado y NEXXT S.A.C.

distribuido por: Av.Mariscal Elov Ureta N° 156 Urb. El Pino (Piso 1 y 3)

San Luis. Lima - Perù Teléfono: (01) 326-1910

Contenido Neto: 500 ml

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:







#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GADGET 120 SC es un insecticida con modo de acción por contacto e ingestión que actúa sobre los insectos principlamente lepidópteros. Por su mecanismo de acción actúa excitando el sistema nervioso de los insectos, provocando su desequilibrio y muerte.

GADGET 120 SC se emplea diluido en agua. Se recomienda preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente de mezclado definitivo y completar la cantidad de agua según las recomendaciones.

GADGET 120 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a nas parihuelas)

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha	(días)	(ppm)
ARÁNDANO	Gusano perforador	Chloridea virescens	0.075-0.10		3	1.5
MAÍZ	Cogollero	Spodoptera frugiperda		0.1	14	2

LMR: Límite Máximo Residuo

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomiendar eracizar como máximo dos aplicaciones por campaña y dos campañas por año con un intervalo de 100 días entre aplicaciones en el cultivo de maiz. Está aplicación también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo, época del año y aparición de la plaga. En el cultivo de arándano se recomienda solo 1 aplicación por campaña/año.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

Compatible con otros plaquicidas de uso común pero no con materiales alcalinos

### FITOTOXICIDAD

a aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar

## RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL

I Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular del registro o con el distribuidor del CATEGORIA TOVICOLOGICA 4







 $\infty$  $\overline{\phantom{a}}$ 

**H** 0,

12,0











Medidas en cm.

Envase: PEAD