

21.00 cm

29.44 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Se debe evitar el contacto con los ojos y la inhalación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas después de la aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
No exponer a la radiación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
En caso de ingestión, dar de beber varios vasos de agua e inducir al vómito. Trasladar de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta. No proporcionar nada a una persona inconsciente.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Llamar a SAMU: 106 / FUNGICOL DEL PERÚ S.A.C. 989 973 074

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
No permita animales en las zonas tratada.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRICHO HV es un producto compuesto por cepas de hongos, que controlan hongos fitopatógenos. Los hongos que componen **TRICHO HV** ejercen control mediante competencia directa por espacio y nutrientes, producción de metabolitos antibióticos, la inactivación de enzimas del agente patógeno, modificación de las condiciones ambientales, producción de sustancias promotoras del crecimiento vegetal y micoparasitismo.

TRICHO HV se puede aplicar mediante un equipo de aspersión foliar. Adicionar agua al tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen requerido, añada la cantidad de **TRICHO HV** requerida por tanque y agite fuertemente. Complete el volumen de agua restante con agitación constante. No almacenar el preparado de un día para otro. Aplique máximo 4 horas después de realizar la preparación y mantenida en agitación, ya que la actividad del producto puede verse afectada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		DOSIS Kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	“Mildiu”	<i>Plasmopara viticola</i>	1.0	N.A.	N.A.

P.C. : Periodo de carencia (días) **LMR** : Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Evaluar permanentemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación. Aplicar cada 7 días, alternando las aplicaciones con fungicidas de otros grupos químicos o mecanismos de acción, aplicar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar cuando la temperatura sea superior a 30° C, no exponer al producto a luz solar directa, no por posible reacción sino para no afectar su actividad biológica. No aplicar cuando haya presencia de lluvia y alta radiación solar.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al campo después de 4 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. Es incompatible con productos químicos fungicidas y oxidantes de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TRICHO HV no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

