

PRESENTACIONES DE 1 kg y 25 kg

Formuladores: FARMEX S.A., QINGDAO AUDIS BIO. TECH. CO LTD, NINGBO SYNAGROCHEM CO., LTD.
Fabricantes: QINGDAO AUDIS BIO. TECH. CO., LTD., NINGBO SYNAGROCHEM CO.,LTD.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Poseidon®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Fludioxonil 250 g/kg
Cyprodinil 375 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrrole + Anilino pirimidine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

POSEIDON®, está compuesto por dos ingredientes activos: fludioxonil, el cual es un fungicida de contacto de alto poder residual y el cyprodinil el cual es un fungicida sistémico, los cuales se utilizan en aplicaciones foliares a manera de aspersión manual de mochila para prevenir y controlar el moho gris. Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de **POSEIDON®**, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	kg/ha		
ARÁNDANO	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.8 - 1.0	3	*2 **3
TOMATE	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500	1.0	3	*3 **1.5

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón. *Fludioxonil, **Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones y en un máximo de 1 campaña recomendada por año. Las aplicaciones se pueden realizar desde la aparición de los primeros síntomas durante la floración o la fructificación.

PERÍODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **POSEIDON®** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos indicados en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Reg. PQUA N° 2758-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 kg / 25 kg

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Formulado por:
NINGBO SYNAGROCHEM CO., LTD.
N° 757, Rili Middle Road, Ningbo 315199 China
Teléfono: + 86-574-83099909

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Versión 3