

14.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

Rampa®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin 18 g/L
 Aditivos.....c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 2751-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERÚ
 Teléfono: (01) 630-6400
 www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 5 L

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

® Marca registrada de FARMEX S.A.

13.00 cm

1.9 cm

14.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

“ LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
 “ MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
 - Este producto es DANINO, no ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. - Evite contacto con la piel y ropa. Causa irritación moderada a los ojos. - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Avernoles
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
 - En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. - En caso de ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber agua sólo si el afectado está consciente. - En caso de inhalación: Traslade al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. - En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.

- Teléfonos de emergencias: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
 - Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. - No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. - No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. - Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. - No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAMPA® es un acaricida - insecticida que actúa por ingestión y contacto, paralizandoo en corto tiempo ácaros fitófagos e insectos minadores.

RAMPA® se absorbe rápidamente a través de las hojas lo que permite controlar insectos minadores con un prolongado efecto residual.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RAMPA® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Amauromyza maculosa</i>	150 - 200	7	0.01
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento, páprika, piquillo)	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150 - 200	3	0.02
CÍTRICOS (mandarina, naranja dulce, limón sutil, limón)	Minador de la hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	100	7	0.01
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	100		
MANDARINA	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	150 - 200	7	0.01
MANGO	Arañita bimaculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	150 - 200	28	0.01
PALTO	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	150	12	0.01
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	7	0.01
	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	100		
VID	Arañita bimaculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	150 - 200	28	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos. P.C.: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En todos los casos, el intervalo de aplicación es de 14 días o más, dependiendo del nivel de reinfestación. En los cítricos no hacer más de 3 aplicaciones por campaña, mientras que para papa no superar las 2 por campaña. La época de aplicación depende de cada cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

RAMPA® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Versión 01