

ETIQUETA PARA USO COMÚN REGISTRADO SENASA

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

**ATENCIÓN**

- Tóxico en caso de ingestión
- Nocivo en contacto con la piel
- Nocivo si se inhala.
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoide: Thiamethoxam
- Piretroide: Lambda-cyhalothrin
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si la respiración es deficiente o ha cesado.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
FARM CROP S.A.C.: +51 959205427

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto.
- Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando.
- Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores.
- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# AZINFOS

## 250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Thiamethoxam : ..... 149.3 g/L  
Lambda-cyhalothrin : ..... 111.5 g/L  
Aditivos : ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 3618 - SENASA

Titular del Registro: FARM CROP S.A.C.



Importador y Distribuidor:  
**FARM CROP S.A.C.**  
Urb. Prolongación Benavides  
Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202-  
Santiago de Surco - Lima, Perú.  
Teléfono: +51 959205427

Formulado por:  
**XIAN HYTECH**  
**AGROCHEMICALS CO., LTD.**  
Room 2002, Unit 3 Building7, Tuspark,  
No.65, Keji 2ndRd, High-tech Zone,  
Xi'an City, Shaanxi Province, China.  
Teléfono: +86-29-89529301

Contenido Neto: **500 ml**  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

"Tóxico en caso de ingestión"  
"Nocivo en contacto con la piel"  
"Nocivo si se inhala"

"Muy tóxico para organismos acuáticos"



# PELIGRO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**AZINFOS 250 SC** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos: thiamethoxam, que actúa por contacto e ingestión, presenta una actividad translaminar y sistémica; y lambda-cyhalothrin, que actúa por ingestión y contacto, con acción residual y propiedades repelentes, y presenta actividad no sistémica. **AZINFOS 250 SC** afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis y finalmente la muerte.

**AZINFOS 250 SC** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a las dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

**AZINFOS 250 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca, motor, pañuelos, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	NOMBRE COMUN	PLAGA NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
			L/ 200L	L/ha		
MAÍZ	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	0.15	21	0.02 (a) 0.05 (b)

PC: Período de Carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos (a) Thiamethoxam (b) Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Considerar en el cultivo de maíz un gasto de agua de 200 L por hectárea. Para el cultivo de maíz se recomienda realizar 1 aplicación por campaña con dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**AZINFOS 250 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO**



ETIQUETA PARA USO COMÚN REGISTRADO SENASA