



30 x 15 cms

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles + Neonicotinoides
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU:106; CISPROMQUIM: 0800-50-847; Syngenta Perú (1) 348 4834

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**
- Peligroso para abejas. No utilice cuando las abejas estén presentes en el campo.
  - No aplique en cultivos en floración desde 10 días antes de la floración y hasta el final de la misma.
  - No permita que la nube de aspersión derive hacia malezas y cultivos cercanos en floración.
  - Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con el agua utilizada para lavar el equipo de aplicación.
  - Lave el equipo de aplicación sobre las áreas tratadas.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
  - Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# QUADRIS ENERGY

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA / INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Azoxystrobin .....	300 g/L
Difenoconazole .....	200 g/L
Thiamethoxam .....	100 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1L

PQA No.

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808. Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima.

**Importado y Distribuido por:**

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú

**Formulado por:**

Syngenta Crop Protection, LLC. (Omaha)

**Contenido Neto: 1 Litro****Lote N°:****Fecha de Form.:****Fecha de Venc.:****NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Los nombres de producto que contengan ® o ™,  
El logo SYNGENTA y el marco CIPRAIME  
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- QUADRIS ENERGY**, es un fungicida/insecticida de acción que combina 3 ingredientes activos: Azoxystrobin y Difenoconazole, que actúan inhibiendo la respiración mitocondrial y la síntesis del ergosterol, de los hongos, afectando su desarrollo y esporulación y thiamethoxam, que afecta el sistema nervioso de los insectos.
- Para la preparación, verter la cantidad de **QUADRIS ENERGY** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/ha	P.C. (días)	L.M.R. *(ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Añublo de la vaina	<i>Rhizoctonia solani</i>	350 - 400	30	5 / 3 / 0.01
	Cigarrita marrón	<i>Tagosodes orizicolus</i>			
	Chinche de la espiga	<i>Oebalus poecilus</i>	400		
	Manchado de grano	<i>Sarocladium oryzae</i>	400		
	Podredumbre de la vaina	<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>	400		
Papa	Rizoctoniosis	<i>Rhizoctonia solani</i>	700	100	7 / 4 / 0.3
	Pulgilla saltona	<i>Epitrix yanazara</i>			

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

\*Azoxystrobin / Difenoconazole / Thiamethoxam

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

- Arroz:** Aplicar previa evaluación de la plaga. Máximo 1 aplicación por campaña (para el control de podredumbre de la vaina: Aplicar máximo 2 veces por campaña). **No aplicar en época de floración.** Utilizar como mínimo un volumen de aplicación de 200 l de agua / ha.
  - Para el control de añublo de la vaina y cigarrita marrón: Usar la menor dosis cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o inicios de la presencia del insecto.
  - Papa:** Realizar una aplicación sobre el tubérculo al momento de la siembra, antes del tapado de la semilla.
- PERIODO DE REINGRESO**
- No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- QUADRIS ENERGY** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

**FITOTOXICIDAD**

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

