

Category	Percentage
1,0 ± 0,3	10%
40,0 ± 0,3	40%
1,0 ± 0,3	10%

 $1,0 \pm 0,3$

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
INHAS S.A.C.: 959168770

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Registro DOLLA Nº XXX SENASA

Registro PQUA N° XXX- SENASA

Titular de Registro:

Formulado por:

JIANGSU GOLDEN CHEMICAL CO., LTD.
11Renmin West Road, Zhangjiagang,
Jiangsu 215600 China.

Importado y distribuido por:

INHAS S.A.C.

Contenido Neto: **10 L**

10 L

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO INFLAMA



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ONIL-720 es un fungicida no sistémico, de amplio espectro y con acción preventiva con larga actividad residual. Posee una capacidad de traslocación local que le confiere una acción de barrera protectante en la superficie de la planta ante numerosas enfermedades de origen fúngico.

ONIL-720 inhibe la respiración de las células del hongo. Los efectos del producto sobre las células fúngicas son la disminución del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las conidias.

ONIL-720 se aplica en aspersión, previa mezcla con agua, mediante pulverizadoras mecánicas, atomizadoras o equipos acoplados al tractor.

ONIL-720 se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar y completar el volumen del caldo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	P L A G A		DOSIS milcil 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	350	7	0.5
ESPÁRRAGO	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	400	14	0.1
PIMIENTO	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400	7	2

P. C.: Periodo de Carenzia

LMR: Límite Máximo Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **ONIL-720** (Chlorothalonil) máximo una aplicación por campaña considerando 2 campañas por año.
Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
No aplicar en época de floración.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede emplear en mezcla con los plaguicidas agrícolas más comunes, excepto los de reacción alcalina. Es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las propiedades fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Medidas en cm.

Envase: PEAD