

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia

- SAMU: 106
- BIOALTERNATIVA E & F S.A.C. Telf. (044) 418431

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano, en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o los envases del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BIO-SUBTILIS

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Bacillus subtilis20 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Reg. N° – SENASA – PBA - ACBM

Titular del Registro: BIOALTERNATIVA E & F S.A.C.



BIOALTERNATIVA E & F S.A.C.
BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

Formulador:

BIOALTERNATIVA E & F S.A.C.
Av. Juan Pablo II No. 172 Las Lomas de Huanchaco – Trujillo – La Libertad – Perú.
Telf: +51 989833843 / +51 941311129
E-mail: bioalternativasac@gmail.com

Importado y distribuido por:

BIOALTERNATIVA E & F S.A.C.
Av. Juan Pablo II No. 172 Las Lomas de Huanchaco – Trujillo – La Libertad – Perú.
Telf: +51 989833843 / +51 941311129
E-mail: bioalternativasac@gmail.com

Fecha de Formulación:
N° de Lote:

Contenido Neto: 1 L, 18 L y 20 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BIO-SUBTILIS es un fungicida protector y de contacto con acción preventiva y curativa para el control directo de diferentes patógenos, que contiene esporas de *Bacillus subtilis*, que actúa por competencia y antagonismo con diversas bacterias y hongos fitopatógenos, además es degradador de la materia orgánica y permite la inducción de Resistencia Sistémica (ISR) de las plantas, lo que permite que éstas generen su propio mecanismo de defensa contra los patógenos.

Para su aplicación, mezcle la dosis recomendada de **BIO-SUBTILIS** en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme, utilizar un coadyuvante. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total.

BIO-SUBTILIS debe ser aplicado cubriendo directamente el follaje de la planta, especialmente las hojas por la parte superior y la parte inferior. Las aplicaciones al suelo van al sistema de riego, verificando que el agua esté en un rango de pH de 5.5 a 7.5 y una dureza menor a 150 ppm de CaCO₃, aplicar en horas de la tarde o de poco sol.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil. 200L	L/Ha		
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	3.0	N.A.	N.A.

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Periodo de carencia (días)
N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Puede ser utilizado de manera preventiva o al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Considerar hasta 02 aplicaciones por campaña, en un intervalo de 15 días. Considerar 01 campaña por año para cultivo de arándano.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda reingresar al área tratada después de 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

BIO-SUBTILIS es compatible con fertilizantes de reacción ácida y productos microbiológicos formulados a base de bacterias y hongos. No mezclar con fungicidas y productos químicos. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad física antes de mezclar con cualquier otro producto.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

