

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CROPS MAX [®]

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- Se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico.
- En caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos entre otros, llevar al paciente al médico más cercano.
- Antídoto: No posee antídoto

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU 106 - INFOSALUD: 113
BITEC AGRO Telf.: 997008111

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite en envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, aisle el área y aleje el personal no autorizado. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área. Recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales destinadas para ese fin.
- Absorber con material adecuado, barrer completamente y meterlo en un recipiente cubierto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.
- No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. Respete las franjas de seguridad de 10 metros en relación con las fuentes de agua.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en las zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas medidas necesarias para controlar la deriva.

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
Paecilomyces fumosorosea.....1x10⁹ Unidades viables/ml (20%)
 Aditivos..... c.s.p 1L (80%)

Registro N° - SENASA
Titular de Registro **BITEC AGRO SAC**
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 997008111

Formulador: **BITEC AGRO SAC**
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 997008111

Distribuidor: **BITEC AGRO SAC**
 Sector Longar (Predio la Huaca con U.C. No. 42259)
 San Juan Bautista - Ica - PERÚ
 Telf.: 997008111

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido Neto: **1 LITRO**
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CROPS MAX**, es un producto a base de cepas naturales del hongo *Paecilomyces fumosorosea* exclusivamente seleccionadas, que presenta acción frente al control de varias plagas de importancia económica. *Paecilomyces fumosorosea* es un hongo imperfecto de la clase Sordariomicetos. La espora del hongo, al ponerse en contacto con el insecto plaga, se le adhiere a la cutícula, penetra directamente después de la germinación, al estar en el cuerpo del insecto, se desarrolla y provoca su muerte al cabo de 7-10 días.
- El uso de **CROPS MAX**, no deja residuos.
- **SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**
 Aplicar **CROPS MAX** con equipos convencionales de aspersión terrestre. Llenar el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, luego añada el producto a la dosis recomendada y agitar constantemente. Luego se completa hasta el volumen de agua a emplear. La aplicación debe realizarse inmediatamente después de preparar la mezcla, asegurándose de realizar un buen mojado, previa calibración del equipo de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo	LMR	
Nombre común	Nombre científico	L/ha	Carencia		
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	1 - 2	NA	NA

P.C.: Periodo de Carencia **LMR:** Límite Máximo de Residuos **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 01 aplicación de **CROPS MAX** por campaña, considerando 01 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 04 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CROPS MAX es incompatible con fungidas sintéticos.

FITOTOXICIDAD

Durante el desarrollo del ensayo se realizó el seguimiento a cualquier efecto negativo que podría causar el insecticida biológico **CROPS MAX** al cultivo de vid; de tal manera podemos concluir que ninguno de los tratamientos y durante todas las evaluaciones efectuadas y en el transcurso del ensayo no se observaron daños y síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA