

ETIQUETA OXAPACK x 10L COEX 50 (28.7cm x 15cm)

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Extremadamente tóxico por ingestión. Es letal si es ingerido.
- Puede ser letal si es inhalado, es extremadamente peligroso e irritante al tracto respiratorio, evite la aspersión.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con los ojos, puede producir quemosis en la conjuntiva, usar el equipo de protección ocular.
- Personas en gestación no deben utilizar ni manipular el producto.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Nunca junto a alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Mantener alejado del fuego.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón o con una solución de bicarbonato de sodio. Encaso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Lleve al paciente inmediatamente al médico.

**Antídoto:** Sulfato de atropina, dosis repetida de 1.2 a 2.0 mg por vía endovenosa cada 10 a 30 minutos hasta completar la atropinización.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106 CICOTOX: (01) 328-7700**  
**AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase tripli lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni cuando se verifica la presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# OXAPACK®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**NEMATICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**Composición:**

Oxamyl ..... 240 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**PQUA N° 1400 - SENASA**

**"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**AGREVO PERUANA S.A.C.**

Jr. San Sebastián 298,  
 Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
 La Molina, Lima - Perú  
 Teléfono: (01) 6328482



**Formulador:**

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.**

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Soad, Songjiang District, Shanghai, China

Contenido neto: **10 Litros**  
 Fecha de formulación  
 N° de lote:  
 Fecha de vencimiento:



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**EXTREMADAMENTE PELIGROSO  
 MUY TÓXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

OXAPACK es un nematocida del grupo de los carbamatos, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión, Actúa inhibiendo la colinesterasa e interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que causa la pérdida de coordinación muscular, convulsiones y finalmente la muerte del nematodo.

OXAPACK, se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar con equipo en buen estado y debidamente calibrado. Las aplicaciones deben ser dirigidas al cuello de la planta.

**Consulte con un ingeniero agrónomo**

CULTIVO	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (L/ha)	P.C.	L.M.R. (ppm)
VID	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	2.0	14	0.01

**PC:** Periodo de carencia (días) **LMR:** Límite máximo de residuos (mg/kg)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

La aplicación se efectuará previa evaluación. Efectuar como máximo 1 aplicación por campaña/año. La dosis máxima a aplicar es de 2,0 L/ha. No aplicar en época de floración, por ser muy tóxico para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas durante 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

