

28 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS

- Si se necesita asesoramiento médico, tener a la mano el envase o la etiqueta del producto.
- Cambiar inmediatamente la ropa contaminada y desecharla de manera segura.
- En caso de inhalación: Mover al aire fresco. Mantener al paciente caliente y en reposo. Llamar al centro de control de intoxicaciones de inmediato.
- En caso de contacto con la piel: Lavar bien con abundante agua y jabón y enjuagar con agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos. Si los tiene, retirar los lentes de contacto después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Llamar a un médico o al centro de control de intoxicaciones.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. No existe un antídoto.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
NUTRITEC COMPANY S.A.C.: (01) 3246534

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Nocivo para la fauna benéfica"
- "No aplicar en época de floración"
- "No aplicar en presencia de polinizadores"
- "No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéfico en el cultivo a tratar o cultivos aledaños"
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto".
- "Aplicar sólo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando".
- "Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores".
- "Peligroso para organismos acuáticos"
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una bande de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre." "No permitir animales en el área tratada".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables"
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas".

SUPRAMEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Abamectin.....65 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO IMPORTADOR Y EXPORTADOR:

NUTRITEC COMPANY S.A.C.

Jr. Santiago Crespo 421 San Luis
Lima - Perú. Cell.: 983 481 769
www.nutritec.biz



FABRICADO Y FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD.
China 9th Floor, No. 58, Nanhu Road,
Nanjing, China

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

Toxico en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPRA-MEX es un acaricida de diferente concentración, con acción de contacto, ingestión y translinar para el control de ácaros fitófagos dañinos en los cultivos. Puede ser usado en cultivo a campo abierto. La preparación de la mezcla de SUPRA-MEX se realiza diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua. luego esta solución se vierte en un cilindro o mochila de aplicación y se completa con agua hasta llegar el volumen requerido. Se agita y se procesa a la aplicación. Se recomienda usar agua limpia y en épocas de mayor calor o brillo solar adicionar a la solución ACEITE VEGETAL DE USO AGRÍCOLA para proteger a la molécula abamectina del rayo solar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Manzano	Araña roja	tetranychus urticae	0.21	7	0.01

L.M.R. = Limite máximo de residuos

PC = Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

SUPRA-MEX debe ser aplicado cuando se observan los primeros vestigios de arañas rojas en el cultivo. Realizar dos aplicaciones por campaña / año puede aplicarse en cualquier etapa fonológica del cultivo (excepto en plena floración).

PERIODO DE REINGRESO:

24 Horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SUPRA-MEX es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción fuertemente acidas o con los pH inferior a 4.5. No mezclar con productos: nitratos, ácidos fosfóricos o sulfato de cobre concentrado.

FITOTOXICIDAD:

SUPRA-MEX "La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos"

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto..

● MODERADAMENTE PELIGROSO

