

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Morrighan[®] SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO SOLUBLE (SG)

Composición:

Glufosinate ammonium 800 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Importador y Distribuidor:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176

Lima, Cercado.

Teléfono: (511) 336 8645

Softagro[®]
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Formulador:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.

4th Floor, Building 5, No. 150 Pubin Road, Nanjing

Teléfono: +86 25 86455985

Fax: +86 25 86455985

N° Lote:

F. de form:

F. de venc:

Contenido neto:

500 g

Nocivo en caso de ingestión /

Nocivo en contacto con la piel /

Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (12 horas). Use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Acido fosfínico.

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de inhalación: retirar al paciente del lugar de exposición, practicar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, lavar bien con abundante agua y jabón por unos 15 minutos, retirar la ropa y calzado.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA - SAMU: 106
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.
(SOLTAGRO): (511) 3368645

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE

DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad local para este fin.

MEDIDA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

DEL AMBIENTE

- "Tóxico para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MORRIGHAN es una herbicida de acción por contacto y no selectiva. Tiene como ingrediente activo a Glufosinate ammonium, el cual es absorbido vía foliar, su translocación es limitada dentro de la planta. Actúa inhibiendo la enzima glutamina sintasa, ocasionando una acumulación de amonio dentro de la planta, causando daño en la estructura de los cloroplastos, una disminución y finalización de la actividad fotosintética produciendo necrosis de los tejidos, dando como resultado la muerte de las malezas.

MORRIGHAN se aplica en forma de aspersión foliar, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Se aplica con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura sobre las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MORRIGHAN es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTÓXICIDAD

MORRIGHAN no es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Mandarina	"Amor seco" "Yuyo"	<i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i>	0.30 - 0.35	40	0.05

LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm) PC: Periodo de Carencia (días) N.A.: No aplica

