

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# IMIDATOP 700

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**COMPOSICIÓN:**

Imidacloprid .....700 g/kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3680 - SENASA

Titular del registro:



AGROINDUSTRIAS ECOFARM S.A.C.

Cal. La Santidad Mz. B Lote. 6 Urbanización Puerta Del Sol, Los Olivos, Lima-Perú

Tel. +51 943167078

Formulador:

QINGDAO AGRO-UNITEK CROPSCIENCE CO. LTD.

Room 304, Haier Road No. 63, Qingdao City, Shangdong, China

Tel: +86 53280995916 Fax: +86 53280995916

Importador y distribuidor:



ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.

Cal. La Santidad Mz. B Lote. 6 Urbanización Puerta Del Sol, Los Olivos, Lima-Perú

Tel. +51 943167078

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: **250 g**

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106  
Teléfono del titular: (511) 943167078

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEL AMBIENTE**

- Peligros para abejas y artrópodos.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto cuando haya probabilidad del movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**IMIDATOP 700**, es un insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos causando un bloqueo, lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

**IMIDATOP 700** puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **IMIDATOP 700** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa sin grumos. Adicionar más agua removiendo continuamente y agregar a través de una malla o cedazo, este preparado, verterlo al tanque de aplicación el cual contiene el resto del agua.

Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto, mantener en marcha el sistema de agitación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Minador de hojas	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.05- 0.075	21	1.0

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Número máximo de aplicaciones por campaña: 02
- Número de campañas por año: 01 para el cultivo de mandarina.
- Aplicar al inicio de la infestación de la plaga y cuando se den las condiciones favorables para la reproducción de la misma.

**PERIODO DE REFINERESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**IMIDATOP 700** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, exceptuando materiales oxidantes, alcalinos, ácidos fuertes y abonos foliares. Antes de realizar la mezcla es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad o consultar con nuestro departamento técnico.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

