

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**ZERPIK® 12 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Spinosa: .....

120 g/L

Aditivos: .....

c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular del Registro: PRECISAGRO S.A.C.**

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,  
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627-3737.



**Formulador: NANJING BIOAGRILAND CROP CARE CO., LTD.**

No.15, Hubu street, Qinhuai District, Nanjing, China.  
Tel: 0086-25-86304886

**Importado y Distribuido por: PRECISAGRO S.A.C.**

Av. Comandante Espinar Nro. 203 Dpto. 4,  
(Piso 4), Miraflores, Lima. Tel: 619 1900 / 627-3737.

Fecha de formulación:

No. de lote:

Contenido neto: 50mL / 100mL / 250mL / 500mL / 700mL / 750mL /

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Tóxico para  
organismos acuáticos



**ATENCIÓN**

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Espirocaina.

En caso de intoxicación lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta\*.

- Antídoto: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático

#### TÉLEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106

PRECISAGRO S.A.C.: 619 1900627-3737.

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego mulicóalo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase tride lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.

- No aplicar en época de floración.

- No aplicar en presencia de polinizadores.

- Tóxico para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

| "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" |                                |                   |                 |                |              |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| CULTIVO                              | PLAGA                          |                   | DOSIS<br>(L/ha) | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|                                      | Nombre común                   | Nombre científico |                 |                |              |
| Tomate                               | Oruga minadora de hoja y tallo | Tuta absoluta     | 0,20*           | 3              | 0,3          |

\*Gasto de agua 500 L/ha  
P.C. Periodo de Carenia

LMR, Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ZERPIC® 12 SC cuando la plaga está presente.

Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campo/huerto.

No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO

