




MULTIPÁGINA 1L



1.5 centimeters

ZORVEC®

Encantia®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSION (SE)

Uso: Fungicida Agrícola.

Grupo químico: Dicarboximide+Piperidinil thiazol Isoxazoline.

Tipo de Formulación: SuspoEmulsión (SE).

REGISTRO PQUA N° 2468 - SENASA


Nombre del Ingrediente Activo: Oxathiapirrolin.

Nombre Químico (IUPAC): 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}-1-piperidyl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone

Fórmula empírica: $C_{24}H_{22}F_6N_6O_5S$

Peso molecular: 539.52 g/mol.

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

™™™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO


Nombre del Ingrediente Activo: Famoxadone.

Nombre Químico (IUPAC): 3-anilino-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazo-Idine-dione-2,4 dione

Fórmula empírica: $C_{24}H_{24}N_2O_4$

Peso molecular: 374.4 g/mol.

Fórmula estructural:



Estado físico de la formulación: Líquido.

Color de la formulación: Blanco.

Capacidad y clase de los envases: 250 ml, 1 litro y 4 litros.

Título del registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III, Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

Formulado por: Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268, USA

Importado y Distribuido por: FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400. Fax: (01) 630-6410.
www.farmex.com.pe

Farmex

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

™™™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Dicarboximide+Piperidinil thiazol Isoxazoline.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñase con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106 - CISPROQUIM: 080-050-847. Corteva Agriscience Perú SAC: 4214811

CONDICIONES MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado, triturándolo o perforándolo y despojado en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zorvec® Encantia es un fungicida activo contra enfermedades causadas por hongos oomicetos. Tiene actividad preventiva y residual. Zorvec® Encantia es sistémico local, translinariar y se mueve sistémicamente por el xilema. Debe ser aplicado dentro de un programa de protección de cultivos incluyendo otros fungicidas que tengan diferentes mecanismos de acción. Zorvec® Encantia es un fungicida que penetra rápidamente en los tejidos de las plantas y es resistente a la lluvia después de 20 minutos, una vez que los residuos de la aplicación se han secado.

Preparación de la mezcla: Vierta la cantidad de Zorvec® Encantia en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ o la mitad. En caso de realizar mezclas con otros productos, primero agregue productos empacados en bolsa hidrosoluble en agua, luego agregue productos formulados como gránulos dispersables y polvo mojable, luego agregue Zorvec® Encantia y otros concentrados según recomendación de la etiqueta. Por último, añada productos a base de aceite y adyuvantes antes de llenar el tanque con agua limpia.

Agite el tanque a fondo para asegurar una mezcla completa. Complete el volumen de agua y agite bien hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla cada vez que vaya a llenar el equipo. No guarde la mezcla en el tanque de la aspersora de un día para otro.

Equipos de aplicación y su calibración: Se recomienda utilizar equipos de aplicación foliar, de uso común en las fincas como bombas de mochila manual o de corriente de aire, previa calibración, procurando lograr la mejor cobertura posible sin llegar al punto de escorrentía.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		*P.C. (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	l/ha	ml/200 l		
Uva	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	0,7	140	30	2 ⁽¹⁾ 0,7 ⁽²⁾
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	250	7	0,02 ⁽¹⁾ 0,01 ⁽²⁾
Tomate	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5	250	1	2,0 ⁽¹⁾ 0,01 ⁽²⁾
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1,0	333	7	0,01 ⁽¹⁾ 0,01 ⁽²⁾
Pimiento	Hielo o Tristeza del pimiento	<i>Phytophthora capsici</i>	0,9	267	30	0,01 ⁽¹⁾ 0,01 ⁽²⁾