

12 cm

**METHOSTOP**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

POLVO SOLUBLE (SP)

**Composición:**

Methomyl ..... 900 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

PQUA N° XXX - SENASA

"Venta sólo por prescripción de un ingeniero agrónomo"

**Titular del Registro:**

AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.

**Importado y distribuido por:**

AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.

Dirección: Jr. Pachacutec n° 339 (Alt. De Jr. Saenz Peña)

Amazonas, Utcubamba, Bagua Grande. Teléfono: 961925844

Email: agrounitek@gmail.com

**Formulador:**

Sinochem Ningbo LTD.

21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000. China

N° Lote:

F. de form:

F. de venc:

Contenido neto:

**100 g****NO INFLAMABLE****NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO****ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

12 cm

**LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUIDADOSAMENTE  
 ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere o inhala. No ingiera ni respire el polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en buenas condiciones en su envase original. Etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el maipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Carbamatos.
- Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta y la hoja informativa conjunta.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes telefonos:

SAMU: 106

AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961925844

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

METHOSTOP es un insecticida del grupo de los carbamatos, que actúa por contacto e ingestión, también posee actividad sistémica ascendente y actividad translinar cuando se aplica a las hojas. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis del insecto.

Aplicar METHOSTOP en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente sobre el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad recomendada de METHOSTOP y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar METHOSTOP (i.a. Methomyl) una a dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando dos campañas al año en espárrago, y una campaña al año para palto y vid y cuando se observe un grado de infestación alto.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se debe esperar un tiempo de hasta 48 horas para ingresar al sector tratado, sin equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD:**

Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | PLAGA             |                              | DOSIS         |          | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------|------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN      | NOMBRE CIENTÍFICO            | kg/ha         | kg/200 L |              |              |
| ESPÁRRAGO | Thrips            | <i>Thrips tabaci</i>         | 0,4           | -        | 2            | 2            |
|           | Gusano de tierra  | <i>Copitarsia turbata</i>    | -             | 0,2      | 1            | 2            |
|           | Gusano perforador | <i>Heliothis virescens</i>   | -             | 0,2      | 1            | 2            |
|           | Gusano cogollero  | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0,4           | -        | 1            | 2            |
| PALTO     | Queresa           | <i>Fiorinia floriniae</i>    | -             | 0,150    | 1            | 0,02         |
|           | Gusano del cesto  | <i>Oiketicus kirbyi</i>      | 0,5           | -        |              |              |
| VID       | Thrips            | <i>Thrips tabaci</i>         | 0,175 - 0,200 | -        | 1            | 0,02         |

PC: Periodo de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

