

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BULLMAX es un fungicida formulado a base de los ingredientes activos azoxystrobin y difenoconazole de acción preventiva, curativa y erradicante. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. Se distribuye homogéneamente por todos los tejidos sin acumularse en los bordes de las hojas.

BULLMAX se emplea diluido en agua; preparar una mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. Iniciar las aplicaciones luego de hacer un monitoreo de la plaga en el campo.

BULLMAX puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a pala o motor, tecnómás, parihuelas, etc.) Utilizar boquillas de cono hueco o cono lleno para una mejor penetración del producto sobre la superficie de la planta. Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Nombre común	Nombre científico	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
				L/200 L	L/ha		
Espárrago	Roya del espárrago	Puccinia asparagi	0,2	0,583	100	0,01	
Arándano	Blueberry leaf rust	Thekopsora minima	0,15-0,2	-	1	a) 5 b) 0,1	

PC: Período de Carencia (días) / LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realiza máximo una aplicación de **BULLMAX** por campaña considerando dos campañas por año y con un intervalo entre aplicaciones de 180 días en el cultivo de espárrago. Para el cultivo de arándano considerar solo una aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

BULLMAX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

BULLMAX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole..... 125 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA N° XXX - SENASA

Titular del Registro:

INHAS S.A.C.:
Calle Los Talladores N° 175, Urb.
Industrial del Artesaano. Ate. Lima -
Perú. Telf: 959168770

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
7 Huanyang East Road, Jixi County,
Anhui Province, China

Importado y distribuido por: INHAS S.A.C.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



