

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/Cil	Kg/Ha		
VID	Gusano ejército	Spodoptera eridania	0.1	0.3	7	0.01* 0.03**

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia *Lufenuron; **Emamectin benzoate

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REDWOLF® es un insecticida que actúa principalmente por ingestión, formulado con dos ingredientes activos, que afectan de manera diferente al insecto: mediante la regulación de su crecimiento y alteración de su sistema nervioso, con lo cual se afecta la formación de quitina y se produce la parálisis del lufenuron la afectación es hacia los primeros estadios de desarrollo.

REDWOLF® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. El equipo de pulverización debe tener el sistema de agitación operativo y en funcionamiento durante toda la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga, y con un máximo de 2 veces por campaña por año, con un intervalo de 7 a 10 días.
Máximo aplicar 0.3 Kg/ha.
En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
NO APLICAR EN ÉPOCA DE FLORACIÓN

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

REDWOLF® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REDWOLF®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICIÓN:	
Emamectin benzoate	50 g/kg
Lufenuron	100 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 3712 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : MONTANA S.A

Nombre común:

Lufenuron

Emamectin benzoate

Grupo químico:

Benzylurea (Lufenuron)

Avermectin (Emamectin benzoate)

Fórmula empírica: C₁₇H₁₈Cl₂F₈N₃O₃ (Lufenuron)

C₅₆H₈₁NO₁₆ (Emamectin B1a)

C₅₅H₇₉NO₁₆ (Emamectin B1b)

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Sólido granulado

Color: Blanco

Olor: Sin olor

pH : 6.0-9.0

Susponsibilidad: 90% mínimo

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:

Presentaciones bolsas por 100 gramos y 1 Kg.

Mecanismo de acción:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REDWOLF® es un insecticida con actividad traslaminar que actúa por contacto e ingesta, utilizado para control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida además de inhibir el crecimiento ya que inhibe la síntesis de quitina en los artrópodos plagas.

Titular del Registro:



Importado y distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado N° 6210, Oficina 401. La Molina, Lima-Perú

Teléfono: (511) 419-3000

e-mail: info@corpmontana.com

Formulado por:
QINDAO AGRO-UNITEK
CROPS SCIENCE CO., LTD.
Rm. 304, Art & Tech Center,
No.63 Haier Road, Qingdao,
China.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO. No ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar (almacén) bajo techo, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Avermectin + Benzoi lurea

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado. Lavar con jabón y abundante agua.
- En caso de inhalación lleva al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial, si la respiración.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

MONTANA S.A.: (511) 419-3000

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

