

480.00 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

THOMAX

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
THOMAX está compuesto por Lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y Thiamethoxam, un

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Tóxico por ingestión: Letal si es ingerido.
- Moderadamente si es inhalado. Evitar respirar vapor o aspersión.

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 – Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
 – Después de usar el producto, cámbiese de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada. Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 – No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
 – Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 – Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 – No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:		Lambda-cyhalothrin 107 g/L	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/cilindro	L/Ha	(días)	(ppm)
-------------------------------------	--	----------------------------------	--------------	-------------------	-------------	------	--------	-------

- Grupo químico: Piretroide/Neonicotinoide.	Thiamethoxam	142.1 g/L				200 L				
---	--------------------	-----------	--	--	--	-------	--	--	--	--

- | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - En caso de intoxicación por ingestión llevar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta. - No administrar nada a una persona inconsciente, obtener ayuda médica de inmediato. - En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos y llevar al paciente al médico. - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón por 20 minutos. - En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico. - No existe antidoto específico. El tratamiento será sintomático. | AditivosC.s.p 1L | <table border="1"> <tr> <td>PIMIENTO</td> <td>"Mosquilla de los brotes"</td> <td><i>Prodioplosis longifolia</i></td> <td>125</td> <td>0.145</td> <td>5</td> <td>0.2⁽¹⁾
0.1⁽²⁾</td> </tr> </table> | PIMIENTO | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodioplosis longifolia</i> | 125 | 0.145 | 5 | 0.2 ⁽¹⁾
0.1 ⁽²⁾ |
| PIMIENTO | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodioplosis longifolia</i> | 125 | 0.145 | 5 | 0.2 ⁽¹⁾
0.1 ⁽²⁾ | | | |
| Reg. PQUA N° 3714 - SENASA | | LMR: Límite máximo de residuos
(1) Lambda-cyhalothrin
(2) Thiamethoxam | PC: Periodo de carencia | | | | | | |
| Titular de Registro: Nutritec Compani S.A.C.
Cal. Felipe S. Crespo N° 421 | | | | | | | | | |

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
NUTRITEC COMPANI S.A.C.: 324 6534


CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD. control de *Prodioplosis longifila*.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y triturándolo o deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado del presente envase.

Importado y distribuido por: Nutris Company S.A.C.  **outotec**

No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
 Anhui Province China.

PERIODO DE REINGRESO:
 Se puede reingresar al campo con protección durante las primeras 24 horas de aplicado el producto.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD:
No existen reportes de fitotoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e



- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106
NUTRITEC COMPANI S.A.C.: 324 6534

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo para otros cultivos o para otros fines. No lo tire al medio ambiente ni lo desechen en los ríos, lagos, mares, etc. Para este fin consulte con las autoridades locales correspondientes.

Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO., LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Cal. Felipe S. Crespo N° 421
San Luis, Lima - Perú
Tel.: 324 6534 Cel.: 983 481 769

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de THOMAX. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra, se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña y año para el control de *Prodiplosis longifolia*.

PERIODO DE REINGRESO: