

Finiquitar® 600EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Butachlor 600 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 836 - SENASA

Grupo Químico:

Chloroacetamide

Nombre Químico:

N-butoxymethyl-2-chloro-2',6'- diethylacetanilide


Formula Empírica:

C₁₇H₂₆ClNO₂

Peso Molecular:

311.9 g/mol

Formula Estructural:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo suave

Olor: Ligeramente aromático

Densidad: 1.04 g/ml a 25°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: Corrosivo

Estabilidad: Estable por 2 años manteniéndolo en su empaque original a temperatura ambiente.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

250 ml, 500ml, 1 L, 4 L, 10 L, 20 L

Titular del registro:

INSUMOS AGRICOLAS PERUANOS S.A.C

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin

Road, Jiangyin, Jianguo, China.

Tel. (86-510)80618101

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cloroacetamidas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, si la irritación es grave, buscar asistencia médica.
- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo, asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C: (01) 499-7831

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo si se ingiere.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Este producto contiene solvente aromático volátil, almacenarlo en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Período de reingreso es de 24 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, ni permitir el ingreso de niños, personas en general, ni animales domésticos al área tratada.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINIQUITAR 600 EC es un herbicida preemergente perteneciente al grupo de las cloroacetamidas. Actúa en el lugar de absorción más importante: el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiendo el crecimiento y causando la muerte. Controla las malezas cuando están germinando.

El arroz es un cultivo que después de trasplantado se mantiene las pozas inundadas con agua, por lo tanto, **FINIQUITAR 600 EC** se aplica puro (de acuerdo a la dosis recomendada), no demanda de gasto de agua.

FINIQUITAR 600 EC puede ser aplicado con botella asperjadora, provista de una tapa con agujeros de 0.5 litros de capacidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FINIQUITAR 600 EC es un herbicida cuya aplicación se realiza en las primeras etapas del cultivo y pre emergente a la maleza. Se efectúa una sola aplicación del producto.

PERÍODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

COMPATIBILIDAD:

FINIQUITAR 600 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Cadillo Coquito Florcita, botoncito Gramalote Verdolaga Yuyo hembra	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Eclipta alba</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	3.0 - 4.0	90	0.1

P.C.: Período de Carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

