

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto inorgánico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de inhalación: Mover a la víctima a un área donde haya aire fresco.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
MONTANA: (01) 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIKO es un fungicida biológico que actúa rápidamente por contacto.
BIKO provoca un desbalance iónico (potasio) al interior de la célula causando una ruptura de la pared celular y el colapso de la célula. Así mismo eleva el pH de la superficie foliar inhibiendo la acción de las enzimas hidrolíticas del hongo. Actúa sobre la germinación de esporas del patógeno e inhibe el crecimiento del micelio que se encuentra sobre la superficie del tejido vegetal.

MODO DE EMPLEO

- **BIKO** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- **BIKO** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda realizar hasta 6 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año y con un intervalo de aplicación de 10 a 14 días.
- Las aplicaciones pueden realizarse desde la etapa de crecimiento vegetativo hasta la cosecha ante los primeros signos de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar el volumen de agua necesario para asegurar la total cobertura de la planta.
- Rotar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades.
- No aplicar el producto con temperaturas que superen los 25 °C.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BIKO es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, excepto con agentes oxidantes y ácidos fuertes. No se recomienda acidificar el medio ni la mezcla con productos de reacción ácida ya que la efectividad del producto puede verse afectada.

FITOTOXICIDAD

BIKO no es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/ 200L	kg/ Ha		
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	3 - 5	1	NA
Arándano	Oidium	<i>Erysiphe elevata</i>	0.6 - 0.8	-	1	NA
Mandarina	Cladosporium	<i>Cladosporium cladosporioides</i>	0.4 - 0.8	-	1	NA
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.8 - 1.0	-	1	NA

- NA: No aplica

