“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

HELMTIOFAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiophanate methyl .....500 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: **HELM DEL PERÚ SAC**
Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago de Surco
Urb. Valle Hermoso Residencial – Dpto 501.
LIMA –PERU

FORMULADOR: **Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd**
Pengcun Village, Xinhang Town, Guangde County,
Xuancheng City, Anhui Province, 242235, China

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR : **HELM DEL PERÚ SAC**
Jr. Los Cerezos Numero 142 Santiago de Surco
Urb. Valle Hermoso Residencial – Dpto 501.
LIMA –PERU

CONTENIDO NETO : 4 L
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Número de Lote :

NOCIVO SI SE INHALA
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Posiblemente carcinogénico.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación, durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso): 24 horas, use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Ingestión: no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y bien aireado, afloje las prendas de vestir y vigile la respiración, si no puede respirar, retire secreciones y cuerpos extraños de las vías respiratorias y proporcione respiración artificial. Trasládelo rápidamente al servicio médico más próximo.
- Contacto con los ojos: lávarlos con abundante agua fresca.
- Contacto con la piel: lávarse con abundante agua y jabón.
- Antídoto: tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106 - HELM DEL PERÚ SAC: (01) 682-7952

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO:
HELMTIOFAN, es un fungicida sistémico que actúa inhibiendo la división celular de los hongos, posee acción residual y puede ser empleado para tratamientos preventivos o curativos mediante aspersiones dirigidas al follaje. Thiophanate-methyl es un benzimidazol. En principio, los benzimidazoles actúan durante la mitosis en las células fúngicas, interrumpiendo así la división celular, lo que provoca la muerte. **Grupo FRAC:** GROUP 1 MBC fungicides: B1.

Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se pretende emplear, adicionar la cantidad de **HELMTIOFAN** de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicional el resto del agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Considerar una (01) aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar **HELMTIOFAN** con otros productos.

FITOTOXICIDAD:
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	%	L/200 L	L/ha		
Papa	“Chupadera fungosa”	*Rhizoctonia solani*	--	--	1.25 - 2.00	21	0.1

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) **P.C.:** Periodo de Carencia (días)