

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, lávese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada a las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni ferrejes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Phosphoricglycine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al hospital más cercano.
- En caso de contacto con las ojos, lávelos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lávelos con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad posible del producto que tiene en el estómago.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- **Nota al Médico:** No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SANJULIO

SERFI S.A.: (01) 710-4068

- **CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Debe usarse para el contenido, enjuagarse tres veces con agua y vaciarlo en el drenaje. No debe usarse para otros fines.
- Los envases vacíos deben ser destruidos o reciclados.
- Entregue o deposite el envase en el lugar designado.
- No debe ser reutilizado.
- No debe ser quemado.
- No debe ser enterrado.
- No debe ser usado para otros fines.
- No debe ser usado para otros fines.
- No debe ser usado para otros fines.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



MY PRODUCCIONES GRAFICAS



ETIQUETA RUSTER UP X 4.5 LITROS

FECHA: 30.04.24
PANTONE: 7 COLORES ESPECIALES.
TAMAÑO: 29.7 X 15.2 CMS
MATERIAL: PAPEL COUCHE
GRAMAJE : 115 GRs
ACABADO FINAL: BARNIZ OFFSET

Ruster up®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición

Glyphosate Isopropilamina 480 g/L
Aditivos 40 g/L

Reg. PQUA Nº - SENASA

Título del Registro

Serfi

Av. República de Panamá 2577

La Victoria, Lima-Perú

Teléfono: 710 - 4068

Fundador por: Agroparagro S.A. S.R.L.

164, Qianhai International Science and Technology Building,

Shanghai 200122

China

Distribuido por:

El Palmer 153 - Lima 12

Perú: (01) 710-4068

Fax: (01) 710-4068

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 4.5 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ruster up es un herbicida post-emergente que se usa en pulverización para el control de malezas anuales y perennes.

Ruster up tiene acción sistémica, penetra a los malezas a través de las hojas y raíces.

Ruster up se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar agua en un envase. Luego se agrega la cantidad de producto que se va a usar y agitar. Después se agrega el total de agua que se va a aplicar. Es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO O AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre Común	Plaga	Concentración	PC (días)	LMR (ppm)
Frijoles	Arándano	Mancha	2-3	14	0.1
Mandarina	Gramma china	Sorghum telegarise	2-3	1	0.5
Maíz	Grammatote	Urochloa indica	2-3	14	0.1
Papa	Gramma dulce	Cynodon dactylon	2-3	3	0.1
Pacana	Coquito	Cyperus rotundus	3	14	0.5
Vid				30	0.05
Barano				28	0.1
Cirle				21	0.1
Caña de azúcar				7	2

PC: Periodo de seguridad LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones están determinadas por la evaluación del campo referente a la presencia de malezas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

Ruster up es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con aquellos con reacción alcalina.

Se debe evaluar la compatibilidad antes de realizar la mezcla.


FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las señaladas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí especificados.

El usuario debe leer cuidadosamente la etiqueta y el prospecto de uso, ya que el producto requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

