

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada a las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico:** Phosphonoglycine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, provoque vómitos hasta que arroje la mayor cantidad posible del producto que tiene en el estómago.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- **Nota al Médico:** No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SERFI S.A.: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego tritúrelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Ruster up®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición
Glyphosate isopropilamina 480 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular del Registro:



Av. República Panama 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: 710 - 4068

Distribuido por:

herra & herrero s.a.
El Palmer 153 - Lima 12
Telf.: 51(1) 479-0286
Fax: 51(1) 479-0418

Formulado por:
Serfi S.A. Co., Ltd.
Science and Technology
Building
Nº 58, Xiangcheng Road,
Pudong New Area,
Shanghai 200122
China

Nº de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Contenido Neto: 200 L

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



BY PRODUCCIONES GRAFICAS			
Black K109	Pantone 355 C	Pantone 295 C	Pantone Y105 379C 14M



ETIQUETA RUSTER UP X 200 L	
FECHA: 30.04.2024	
PANTONE: 7 COLORES ESPECIALES.	
TAMAÑO: 32 X 48.5 CMS	
MATERIAL: PAPEL COUCHE ADHESIVO	
GRAMAJE : 80 GRs	
ACABADO FINAL: BARRIZ OFFSET- SEMI CORTE PARA DESGLOSE	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ruster up es un herbicida post-emergente que se usa en pulverización para el control de malezas anuales y perennes.
Ruster up tiene acción sistémica, penetra a los malezas a través de las hojas y rizomas destruyendo toda la planta.
Ruster up se usa en pulverización sobre el follaje. Para preparar la solución de aplicación se deberá colocar agua hasta el envase. Luego se agrega la cantidad de producto que se va a usar y se agita. Después se agrega el total de agua que se va a aplicar, es necesario calibrar el equipo de aplicación, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Nombre Común	Plaga	Nombre Científico	Dosis L/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
Cereales	Gramma china	Sorghum halepense	Sorghum halepense	2-3	14	0.1
					1	0.5
					14	0.1
					14	0.1
Papas	Gramma dulce	Urtica dioica	Urtica dioica	2-3	3	0.1
					14	0.5
					14	0.5
					14	0.5
Café	Coquito	Cyperus rotundus	Cyperus rotundus	3	30	0.05
					28	0.1
					21	0.1
					Café de azúcar	
Tc						2

PC: Periodo de carencia LWR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones estarán determinadas por la evaluación del campo referente a la presencia de malezas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD

Ruster up es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado de aquellos con reacción alcalina.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

