PILARAVIA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Abamectina .....31 g/L
Spirotetramat.....124 g/L
Aditivos:.....c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659

Importador y Distribuidor:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659

Formulador:
JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.
N°9, Konglian RD, Salinization New Material
Indutrial Park, Huaian, China.
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: 5 L

Nocivo en caso de ingestión | Nocivo en contacto con la piel / Nocivo si se inhala

CUIDADO, EVITE CONTACTO
POSIBLE CARCINOGÉNICO

¡NO INFLAMABLE!

¡NO CORROSIVO!

¡NO EXPLOSIVO!

ATENCIÓN

PRIMER PDF	**V01 | Cara Anterior 5 L**
Producto: Pilaravia	**País:** Perú
Fecha: Enero 17, 2023	**Tamaño:** 140 x 156 mm

TINTAS (5)		
Cian	Amarillo	Pantone 293 C
Negro	Magenta	

CONTROL DE CAMBIOS

BORRADOR

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Nocivo si se inhala. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Cuidado evite el contacto posible teratogénico. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas después de la aplicación. El periodo de reentrada al área tratada será de 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Avermectinas y Ácido tetrámico. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
PILARBIO PERU SAC: (01) 363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo,y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas y/o artrópodos benéficos en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. No aplicar cerca de las colmenas de las abejas, proteger los colmenares antes de la aplicación del producto. Aplicar solo a primeras horas de la mañana o al atardecer cuando las abejas no estén polinizando. Evitar que la aplicación este dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. Muy toxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARAVIA abamectin es un insecticida, acaricida y antihelmíntico de acción translaminar ampliamente utilizado en la agricultura. Su modo de acción afecta al sistema nervioso de los insectos provocando en última instancia su muerte. Spirotetramat , es un inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse, ocasionando la muerte del insecto. Una vez que el ingrediente activo ingresa a la planta, Spirotetramat se hidroliza a su forma enólica

PILARAVIA se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
VID	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	1.2	8	*2 **0.01
TOMATE	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.60	28	*1 **0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia
** ABAMECTINA * SPIROTETRAMAT

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 1 campañas/año.para el cultivo de vid y 2 campañas para el cultivo de tomate.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PE - 17/01/2024

ARCHIVO FINAL	V01 | Cara Posterior 5 L
Producto: Pilaravia	**País:** Perú
Fecha: Enero 17, 2023	**Tamaño:** 140 x 156 mm

TINTAS (5)		
Cian	Amarillo	Pantone 293 C
Negro	Magenta	

CONTROL DE CAMBIOS

∞