

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Tóxico por ingestión. No es irritante a los ojos, no es irritante cutáneo. No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Mantener el producto alejado del fuego. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada [12 horas] use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, lagabocas o mascarara y guantes. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas. Realizar aplicación siguiendo la dirección del viento.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Cymoxanil: Acetamida. Cyazofamid: Imidazol.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta. **En caso de ingestión:** No inducir al vómito.No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. **En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentas de contacto si los hubiera. **En caso de contacto con la piel,** retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. **En caso de inhalación,** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: 991547222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilmente triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Muy tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Cyazofamid.....85 g/L
Cymoxanil.....170 g/L
Aditivos:.....c.s.p. L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERÚ S.A.C

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel: 363-8659



Formulador: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.

Nº9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huai'an, China.
Tel. FAX: (+860517) 8990-6688



Importador y Distribuidor: PILARBIO PERÚ S.A.C

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARZOX es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos, cyazofamida el cual posee una actividad antiesporulante y una moderada actividad traslaminar y curativa, inhibiendo la respiración de los hongos y cymoxanil el cual tiene una actividad preventiva y curativa. Previene la germinación de esporas, la formación de haustorios y el crecimiento micelial de los patógenos objetivos.

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de PILARZOX luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PAPA	Rancho o hielo	Phytophthora infestans	0.4 - 0.5	14	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.
(1) Cymoxanil (2) Cyazofamid

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

PILARZOX se recomienda como máximo hasta 2 aplicaciones en papa, con un intervalo de 30 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 12 horas para reingresar al sector tratado con equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD:

PILARZOX no es fitotóxico si se aplica con la dosis adecuada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



ARCHIVO FINAL	V01 Ref. Etiqueta 500 ml	TINTAS (5)	NOTAS
Producto: Pilarzox	País: Perú		
Fecha: Junio 7, 2024	Tamaño: 205 x 115 mm		