

PILARZOX®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Cyazofamid.....85 g/L
Cymoxanil170 g/L
Aditivos:C.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659



Titular de Registro:
PILARBIO PERÚ S.A.C
Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B
Urb Chacarilla del Estanque.
Tel.: 363-8659

Formulador:
JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.
N°9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huaian, China.
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688



Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: **20 L**

MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

ARCHIVO FINAL	V01 Cara Anterior 20 L
Producto: Pilarzox	País: Perú
Fecha: Junio 10, 2024	Tamaño: 170 x 170 mm

TINTAS (5)	
Cian	Amarillo
Negro	Magenta
Pantone 293 C	

CONTROL DE CAMBIOS

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Tóxico por ingestión.
- No es irritante a los ojos, no es irritante cutáneo.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo con el periodo de reentrada (12 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar aplicación siguiendo la dirección del viento.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico:** Cymoxanil: Acetamida. Cyazofamid: Imidazol
- En caso de intoxicación,** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión:** No inducir al vómito.No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Retirar lentas de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel,** retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación,** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / PILARBIO PERU SAC: 991.547222

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARZOX es un fungicida que combina la acción de dos ingredientes activos, cyazofamida el cual posee una actividad antiesporulante y una moderada actividad traslaminar y curativa, inhibiendo la respiración de los hongos y cymoxanil el cual tiene una actividad preventiva y curativa. Previene la germinación de esporas, la formación de haustorios y el crecimiento micelial de los patógenos objetivos.

Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del volumen de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **PILARZOX** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Cil	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
PAPA	Rancha o hiello	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.5	14	0.05 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.
(1) Cymoxanil (2) Cyazofamid

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:

PILARZOX se recomienda como máximo hasta 2 aplicaciones en papa, con un intervalo de 30 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 12 horas para reingresar al sector tratado con equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los productos que contengan surfactantes No-iónicos. Realizar siempre la compatibilidad a pequeña escala. No mezclar con productos de pH superior a 10.

FITOTOXICIDAD:

PILARZOX no es fitotóxico si se aplica con la dosis adecuada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

PE-10/06/2024



ARCHIVO FINAL

V01 | Cara Posterior 20 L

Producto: Pilarzox

País: Perú

Fecha: Junio 10, 2024

Tamaño: 170 x 170 mm

TINTAS (5)

Cian

Amarillo

Pantone 293 C

Negro

Magenta

CONTROL DE CAMBIOS