

TE-BUZHINA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

Composición:

Tebuconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: YC Agro Perú S.A.C.

Importado por:

YC Agro Perú S.A.C.

Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409 San Isidro, Lima-Perú

Teléfono +51 983275668 / E-mail: sales@ycagro.pe

Formulado por:

Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited

12AB Xinhao Fang Building, No.11018 Shennan Road,

Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.

Teléfono: +86 755 86182089

E-mail: director@yanchengchem.com

Fecha de Formulación:

N° de lote:

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO




Nombre común: Tebuconazole

Nombre químico: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
CAS 107534-96-3

Formula química: C₁₆H₂₂ClN₃O

Peso molecular: 307.82 g/mol

Fórmula estructural:



Propiedades físico químicas:

Estado físico: Líquido

Color: Amarillo claro

Olor: Característico

Densidad relativa: 990 g/l a 20°C.

pH: 6.7

No explosivo

No corrosivo

No inflamable

Estabilidad de almacenamiento:

No hay cambios significativos observables en el contenido del producto GALECUR 25 EW, después del almacenamiento durante 14 días a 54 ± 2°C en comparación con el análisis inicial. Por lo tanto, se concluye que la vida útil de Galecur 25 EW no sea inferior a 2 años.

Presentaciones: 250ml, 500ml, 1L, 4L, 5L, 20L y 200L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos
- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar a la zona tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico, muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los ojos estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládala a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

YC AGRO PERÚ S.A.C.: +51 983275666

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el acceso al área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MODO DE ACCIÓN:

Sistémico con acción protectora, curativa y erradicante. Altera la función de la membrana. Inhibidor de la biosíntesis de esteroides. El tebuconazole es un inhibidor de la desmetilación y pertenece a la clasificación del modo de acción del grupo 3 del Comité de Acción de Resistencia a los Fungicidas. Los fungicidas de triazol son típicamente de amplio espectro y exhiben una rápida translocación mediada por el xilema y resistencia a la lluvia. Se considera que tiene un riesgo medio de desarrollo de resistencias.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TE-BUZHINA es un fungicida de amplio espectro cuya acción formulada a base de Tebuconazole, actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides en los hongos o patógenos. Por su actividad sistémica es capaz de penetrar de manera muy rápida a los tejidos foliares lo cual permite afectar el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas de la enfermedad y cuando estos ya son visibles.

METODO Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

Aplicar con equipos terrestres de aspersión, previa mezcla con agua. Para realizar la aplicación haga una mezcla del producto a la dosis recomendada con la mitad del volumen de agua a utilizar, luego agite hasta que el producto esté bien diluido y complete el volumen de aplicación. Asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado para evitar sobre o sub dosificaciones del producto. Durante la preparación de la mezcla y aplicación mantener en marcha el sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Espárrago	Roya del espárrago	Puccinia asparagi	0.50	100	0.05

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se presenten las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad o cuando se evidencie la aparición de los primeros síntomas.

Se recomienda 1 aplicación por campaña.

Para el caso del cultivo de espárrago, se considera 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 48 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos extremadamente ácidos o alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

