

# FUNGI-ONE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

Cymoxanil.....80 g/Kg.  
Mancozeb.....640 g/Kg.  
Aditivos.....c.s.p. 1 kg.

PQUA N° xxxx-SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**

**AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.**

Dirección: Jr. Pachacutec n° 339 (Alt. De Jr. Saenz Peña)

Amazonas, Utcubamba, Bagua Grande.

Teléfono: 961925844

Email: agrounitek@gmail.com



**FORMULADO POR:**

**ANHUI FENGLE AGROCHEMICAL CO., LTD.**

4 Chuangye Road, Hefei, P.R. China 230031

Tel.: 0086-551-5360941

**IMPORTADO & DISTRIBUIDO POR:**

**CHEMICAL INDUSTRIAL VALMED S.A. - CHEMIVAL S.A.**

Dirección: Calle Las Turquezas Mz. F Lt. 28 Urb. San Eulogio

(2da Etapa) - Comas

Telefono: (01) 524 0647

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

Lote N° :

Contenido neto : 0.2 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"Mantengase bajo llave fuera del alcance de los niños"**

<p><b>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa.</li> <li>- Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos.</li> <li>- Moderadamente irritante a los ojos.</li> <li>- Peligroso si es inhalado.</li> <li>- Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.</li> <li>- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación.</li> <li>- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.</li> <li>- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.</li> <li>- No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal.</li> <li>- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.</li> <li>- No aplicar en dirección contraria al viento.</li> <li>- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.</li> </ul> <p><b>PRIMEROS AUXILIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.</li> <li>- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.</li> <li>- Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático.</li> <li>- En caso de ingestión, provoquese el vomito, siempre que el paciente este consciente.</li> <li>- No tiene antidotos específicos.</li> <li>- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:</li> </ul> <p align="center"><b>SAMU: 106</b>  <b>AGRO UNITEK CROPSCIENCE S.A.C.: 961-925-844</b></p> <p><b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.</li> <li>- No re-utilizar los envases.</li> </ul>	<p><b>MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.</li> <li>- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.</li> <li>- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.</li> </ul> <p><b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FUNGI-ONE</b> es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple, que previene y cura una diversidad de enfermedades fúngicas del Orden Peronosporales.</li> <li>- <b>FUNGI-ONE</b> es un agente curante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta.</li> <li>- <b>FUNGI-ONE</b> tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo.</li> </ul> <p><b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.</li> </ul> <p><b>PERIODO DE REINGRESO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 horas después de la aplicación.</li> </ul> <p><b>COMPATIBILIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.</li> </ul> <p><b>FITO TOXICIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No es fito tóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.</li> <li>- Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta.</li> </ul> <p><b>RESPONSABILIDAD CIVIL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.</li> </ul>
---	--

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (KG)		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Por 200 L. de agua	Por Ha.		
Papa	"Ranchar" ó "Hielo fungoso"	Phytophthora infestans	0.5	1.5 - 2.0	14	0.05 (Cymoxanil) 0.3 (Mancozeb)

L.M.R. = Limite Maximo de Residuos | P.C.: Período de Carencia

