

CURAKA 720

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Cymoxanil.....80 g/Kg.
Mancozeb.....640 g/Kg.
Aditivos.....c.s.p. 1 kg.

PQUA N° 3778-SENASA

Titular del registro: NEXXT S.A.C.

Importado y distribuido por:
NEXXT S.A.C.

Av. Mariscal Eloy Ureta N° 156.
Urb. El Pino (Piso 1 y 3). San Luis, Lima-Perú
Tel.: 3261910



FORMULADO POR:

AGRO-CARE CHEMICAL INDUSTRY GROUP LIMITED

343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Provic
Telef: 0086-510-82791479
P.R. CHINA

Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Lote N° :
Contenido neto : 20 Kg.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Mantengase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: - Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. - Tóxico por ingestión, puede provocar vómitos, diarrea y espasmos. - Moderadamente irritante a los ojos. - Peligroso si es inhalado. - Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores. - Mantener alejados a los niños y animales del lugar de aplicación. - No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones. - No se transporte ni almacene junto a producto alimenticios, medicinas de uso humano o animal. - Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto. - No aplicar en dirección contraria al viento. - Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado. PRIMEROS AUXILIOS: - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. - Ayuda básica, descontaminación y tratamiento sintomático. - En caso de ingestión, provoquese el vomito, siempre que el paciente este consciente. - No tiene antidotos específicos. - En caso de emergencia toxicológica llamar a: SAMU: 106 / NEXXT S.A.C.: 3261910 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: - Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. - No re-utilizar los envases.	MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: - CURAKA 720 es un fungicida sistémico de amplio espectro y acción múltiple, que previene y cura una diversidad de enfermedades fungosas del Orden Peronosperales. - CURAKA 720 es un antiesporulante que no es lavado por la lluvia al penetrar rápidamente a la planta. - CURAKA 720 tiene doble acción previene la enfermedad al formar una barrera sobre la superficie de la planta impidiendo la germinación de las esporas y en el interior de la planta evita la esporulación, cura y erradica al hongo. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: - Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad y repetir cuando sea necesario hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña. PERIODO DE REINGRESO: - 24 horas después de la aplicación. COMPATIBILIDAD: - Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina. FITO TOXICIDAD: - No es fito tóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. - Se puede emplear en todos los estados de desarrollo de la planta. RESPONSABILIDAD CIVIL: - El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
---	--

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (KG)		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Por 200 L. de agua	Por Ha.		
Papa	"Rancha" ó "Hielo fungoso"	Phytophthora infestans	0.5	1.5 - 2.0	14	0.05 (Cymoxanil) 0.3 (Mancozeb)

L.M.R. = Limite Maximo de Residuos | P.C.: Periodo de Carencia

