

# SHIKEMA® 200

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

## Composición:

Glufosinate-ammonium .....200 g/l  
Aditivos..... c.s.p. 1 l

Reg. PQUA N° 3777 – SENASA

## TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC® PERÚ S.A.C.

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores,  
Lima - Perú.

Teléfono: +51 1 444 – 3663



## FORMULADOR:

Shandong Eshung Industrial Co., Ltd.

Dirección: Huji Town, Jinxiang County,  
Jining Chemical Industrial Park, Jining City,  
China.

Teléfono: 86-0537-8018989

## Contenido Neto: 10 litros

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

P.V.P.:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

NOCIVO PARA ORGANISMOS  
ACUÁTICOS



# ATENCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ácido Fosfínico.
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar ropa y calzado contaminado.
- En caso de inhalación: retirar al paciente del lugar de exposición y trasladarlo a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 - INFOSALUD: 113 - CICOTOX: 0800-1300  
AGRIPAC PERÚ SAC: (01) 444-3663

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- “Nocivo para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**SHIKEMA® 200** es un herbicida de acción por contacto y no selectivo. Tiene como ingrediente activo a glufosinate ammonium, el cual es absorbido vía foliar, su traslocación es limitada dentro de la planta. Actúa inhibiendo la enzima glutamina sintetasa, ocasionando una acumulación de amonio dentro de la planta, causando daño en la estructura de los cloroplastos, una disminución y finalización de la actividad fotosintética produciendo necrosis de los tejidos, dando como resultado la muerte de las malezas. **SHIKEMA® 200** se aplica en forma de aspersión foliar. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Se aplica con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura sobre las malezas.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (DÍAS)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	l/200l	l/ha		
Palto	Amonio seco	<i>Bidens pilosa</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	7	0.01
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

P.C.: Periodo de carencia  
L.M.R.: Límite máximo de residuos  
N.A.: No aplica

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar dos aplicaciones por campaña por año como máximo y una frecuencia entre aplicaciones de acuerdo a los resultados.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

**SHIKEMA® 200** es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción con los carbonatados. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

