

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente irritante a los ojos, ligeramente irritante a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o mascarara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.
- No contiene antídoto específico, se recomienda tratamiento sintomático.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:

SAMU: 106

NOVALTY: (01) 688-2986

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

ENZYFOL

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Celulasas.....100 g/L
Gluconasas.....200 g/L
Aditivos 1 L

Reg. N° XXX - SENASA-PBA

TITULAR DE REGISTRO: NOVALTY S.A.C.

Formulado por: Pol. Ind. La Isla, Avda. Río Viejo N° 57-59
41703 Dos Hermanas (Sevilla). España
Teléfono: (34) 954 930 942
Fax: (34) 954 930 899
<http://www.trichodex.com>

Importador y distribuidor:

Av. La Floresta N° 265
Urb. Chacarilla del Estanque - San Borja - Lima
Teléfono: (01) 688-2986
E-mail: calidad@novaltyperu.com

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
N° de lote:
Contenido neto:

200 LT

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ENZYFOL, actúa principalmente mediante dos mecanismos de acción; acción directa sobre el patógeno y acción indirecta sobre la planta. Las celulasas y gluconasas presentes en ENZYFOL actúan sinérgicamente inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento de una gran variedad de hongos fitopatógenos.

ENZYFOL es una formulación líquida en base a un concentrado enzimático con acción fungicida y extractos específicos de paredes celulares de levaduras con una acción bio-elicitadora contra patógenos fúngicos.

MODO DE EMPLEO

Usar en los cultivos recomendados, siguiendo las recomendaciones indicadas en la etiqueta. Se puede emplear en cualquier estado de desarrollo del cultivo. Por ser un producto orgánico no tiene restricciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/Ha		
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.8 - 1.0	2 - 3	NA	NA
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.6	3	NA	NA
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.8	3	NA	NA
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.8	3	NA	NA

LMR: Límite máximo de residuos P.C: Periodo de Carencia N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Disolver en 100 litros de agua la solución, luego completar hasta lo recomendado.

CAFÉ: Aplicar al inicio de la enfermedad, procurando un buen mojado del área foliar.

N° aplicaciones / campaña: 2 N° campañas / año: 1

CEBOLLA: Aplicar al inicio de la enfermedad, procurando un buen mojado del área foliar.

N° aplicaciones / campaña: 2 N° campañas / año: 1

ESPÁRRAGO: Aplicar al inicio de la enfermedad, procurando un buen mojado del área foliar.

N° aplicaciones / campaña: 2 N° campañas / año: 1

VID: Aplicar al inicio de la enfermedad, procurando un buen mojado del área foliar.

N° aplicaciones / campaña: 2 N° campañas / año: 1

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con cobre, aceites minerales ni mezclas sulfo-cálcicas. No es aconsejable su mezcla con productos de fuerte reacción alcalina.

Es compatible con Acaricidas, Isecticidas, Fungicidas y Fertilizante foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD

ENZYFOL, no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

