

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# SACUTE 38% WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES – WG**

**Composición**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cymoxanil.....   | 280 g/kg   |
| Metalaxyl-M..... | 100 g/kg   |
| Aditivos.....    | c.s.p 1 kg |

Reg. PQUA N° - SENASA

**Titular de registro:** ADVANGROW AGROSCIECNCE PERU S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409, San Isidro, Lima-Perú  
Tel.: +51 983275666 / Email: manager@advangrow.pe

**Formulador:** QINGDAO AGRO-UNITEK CROPS SCIENCE CO., LTD.  
Room 304, Haier road No.63, Qingdao City, Shangdong, China  
Tel: +86 532 80995916 / info@agro-unitek.com

**Importador:** ADVANGROW AGROSCIECNCE PERU S.A.C.  
Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409, San Isidro, Lima-Perú  
Tel.: +51 983275666 / Email: manager@advangrow.pe

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido neto: 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg y 25 Kg**

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA

MUY PELIGROS PARA ORGANISMOS  
ACUATICOS



**PELIGRO**

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Causa irritación moderada a los ojos
- Cuidado, evite el contacto, posible TERATOGENICO.
- Cuidado, evite el contacto, posible CARCINOGENO.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separada y bañese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Mantener el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente. No almacenar en casa de habitación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentas de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

**SAMU: 106**

**INFOSALUD: 113**

**Advangrow Agrosience Peru S.A.C.: +51 983275666**

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola y entréguela o depositelo en el lugar de destino dispuesto por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA           |                               | DOSIS   |          | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|-----------------|-------------------------------|---------|----------|----------------|-----------------|
|         | NOMBRE<br>COMUN | NOMBRE<br>CIENTÍFICO          | Kg/Cil. | Kg/Ha    |                |                 |
| Papa    | Rancha          | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.5     | 0.75-1.0 | 14             | 0.05*<br>0.5**  |

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (\*Cvprodinil \*\*Metalaxyl-M)

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Sacute 38% WG** es producto fitosanitario a base de una mezcla de dos ingredientes activos: cymoxanil y metalaxyl-M. Cymoxanil es un fungicida foliar con acción protectora y curativa. Tiene actividad sistémica local y de contacto, y también inhibe la esporulación. Metalaxyl-M es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa, absorbido por hojas, tallos y raíces. La combinación de las propiedades de dichos ingredientes activos actúa en forma diferente y complementaria, reduciendo de este modo las posibilidades de desarrollo de resistencia.

Aplicar **SACUTE 38% WG** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales o mecanizadas. Para preparar la mezcla, agregar **SACUTE 38% WG** al tanque de aplicación con agua hasta la mitad de su capacidad, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea. Una vez diluido el producto, completar el volumen a utilizar.

Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación debidamente calibrado.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Realizar 1 a 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días entre aplicaciones. Considerar 2 campañas al año para el cultivo de papa. Alternar con productos de diferente modo de acción.

Utilizar un volumen apropiado de agua para así lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**SACUTE 38% WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.

### FITOTOXICIDAD

**SACUTE 38% WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta. La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4:  
LIGERAMENTE PELIGROSO**

