"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- -Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- -Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- -Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación.
- -Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Sulfolinurea (Nicosulfuron) Triketone (Mesotrione)

- -En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- -En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- -En caso de inhalación: trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- -En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos, permaneciendo con los parpados abiertos durante
- -En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.
- -Antídoto: El producto no tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / RAINBOW AGROSCIENCES: (01) 678-9544

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- -Muy tóxico para organismos acuáticos.
- -No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- -En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

FORMAIZE PLUS

PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

DISPERSIÓN EN ACEITE (OD)

COMPOSICIÓN:

Mesotrione	75 g/L
Nicosulfuron	30 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C

Av. Alfredo Benavides Nº 2150, Int. 701 Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: (01) 678-9544



FORMULADOR:

QINGDAO RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

No 8 Haipubei road, Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry Base, Qingdao, Shandong, China Teléfono: +86-532 - 68081298 https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU S.A.C.

Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 701

Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú. Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 200L N° de Lote:

Fecha de Formulación: Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos acuáticos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORMAIZE PLUS es un herbicida selectivo post-emergente de acción sistémica y de traslocación acropétala y basipétala recomendado para el control de malezas de hojas anchas y leñosas.

Agitar el contenido de FORMAIZE PLUS en su envase original, hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro conteniendo la mitad de agua limpia. Agitar hasta lograr una mezcla homogénea y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre y empleando boquilla de tipo abanico.

La absorción de **FORMAIZE PLUS** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	N. Común	N. científico	L/ha	(días)	(ppm)
Maíz	"Pata de gallina" "Pega pega" "Verdolaga" "Yuyo"	Eleusine indica Setaria verticilata Portulaca oleracea Amaranthus dubius	1.5	45	0.01

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación cuando se observen las primeras malezas y dirigido a ella. Se recomienda aplicar FORMAIZE PLUS máximo una vez por campaña, considerando una campaña al año para el cultivo de maíz.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

FORMAIZE PLUS es incompatible con sustancias fuertemente alcalinas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica 4: LIGERAMENTE PELIGROSO



















PELIGRO













