

19 cm

18.5 cm

Nemarex®

ACEITE DE TOMILLO

NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

ACEITE DE TOMILLO 35 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
AGRO MICRO BIOTECH S.A.C.
Av. La Molina N° 3557
Oficina 302 Urb. El Sol de la Molina
Lima - Perú
Telef.: (511) 368-351
www.AgroMicroBioTech.com
Formulador:
BIO HUMA NETICS INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233
Telef.: +01 480 961 1220
E.E.U.U



Contenido Neto: 10 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

2.78 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
 - No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
 - Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
 - Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. Evite el contacto con la piel.
 - Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
 - No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
 - Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
 - Almacenese en un lugar seguro, bajo llave; a la sombra, protegido de la intemperie y fuera del alcance de los niños.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, beba grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe la naturaleza ácida de este producto.
 - En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
 - En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
 - Antídoto: No hay antídoto específico.

Teléfonos de emergencia:
ESSALUD: 080110200;
Oficina TriebUp S.A.C.: (511) 7022-895.



Nota al Médico: Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
DL 50 Oral: > 2000 mg/Kg | DL 50 Dermal: > 4000 mg/Kg

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
Devuelva el envase al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Lavar los envases con agua limpia y usar esa solución junto con la mezcla inicial, además no olvidar de perforar los envases y disponerlos en puntos de acopio autorizados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. Si se usa y se maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- Aplique NEMAREX® al suelo, de acuerdo con el "CUADRO DE USOS", durante la temporada mediante el sistema de riego, como un preventivo o curativo para nematodos. Utilice el producto en dosis bajas, cuando el nivel de infestación sea fuerte. Nunca aplicar mas de 1% de aceite en mezcla.

SISTEMA DE REPARACIÓN Y APLICACIÓN
INSTRUCCIONES DE MEZCLA:
- Siempre calibre su equipo de aplicación. Agite vigorosamente el producto antes de utilizar y la mezcla una vez que haya realizado. Para preparar la mezcla, tiene el tambos a 3 cuartos de la capacidad de agua, agregue el producto, y termine de verter el último cuarto de agua, mezclando completamente. Si durante la mezcla y aplicación hay presencia de espuma, se puede añadir un agente antiespumante para prevenirla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:
Es importante que al utilizar NEMAREX® como nematicida, el producto este bien incorporado al suelo. Se puede hacer esto incorporándolo mecánicamente en la marca, o mediante el sistema de riego por goteo, aspersión o rodado.

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis (Lt/ha)	UAC (Dosis)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	5,0 - 5,5	0	0

UAC: 0 días. LMR: Cero residuos por ser un producto de naturaleza orgánica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar tres aplicaciones de NEMAREX con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. Aplicar de manera preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, nutrientes foliares, reguladores de crecimiento o fungicidas siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y diluciones indicadas en esta etiqueta.



PANTONES

Orla

Franja toxicológica

Logotipo

pantone
TypoGraphica
C:39 M:24 Y:23 K:22

Logotipo Agro Micro Biotech