

19 cm

33 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: Cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. Evite el contacto con la piel.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacenese en un lugar seguro, bajo llave; a la sombra, protegido de la intemperie.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, beba grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe la naturaleza ácida de este producto.
 - En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
 - En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
 - Antídoto: No hay antídoto específico.
- DL 50 Oral: >2000 mg/Kg | DL 50 Dermal: >4000 mg/Kg
Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 080110200; Oficina Agro Micro biotech S.A.C.: (511) 368-3531.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Lavar los envases con agua limpia y usar esa solución junto con la mezcla inicial, además no olvidar de perforar los envases y disponerlos en puntos de acopio autorizados.

NOTA AL COMPRADOR

Agro Micro Biotech S.A.C. garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. Si se usa y se maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



Nemarex®

ACEITE DE TOMILLO

NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

ACEITE DE TOMILLO 35 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° XXX – SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
TRIEBUP S.A.C.
Av. Paseo de la República N° 4682
Oficina 400A, Miraflores
Lima - Perú
Telf.: (511) 7022-895

Formulador:
BIO HUMA NETICS INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, Az 85233
Telf.: +01 480 961 1220
E.E.U.U

Contenido Neto: 1040.87 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS"



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplique NEMAREX® al suelo, de acuerdo con el "CUADRO DE USOS", durante la temporada mediante el sistema de riego, como un preventivo o curativo para nematodos. Utilice el producto en dosis bajas, cuando el nivel de infestación sea fuerte. Nunca aplicar mas de 1% de aceite en mezcla.

SISTEMA DE REPARACIÓN Y APLICACIÓN NSTRUCCIONES DE MEZCLA:

- Siempre calibre su equipo de aplicación. Agite vigorosamente el producto antes de utilizar y la mezcla una vez que haya realizado. Para preparar la mezcla, tiene el tambos a 3 cuartos de la capacidad de agua, agregue el producto, y termine de verter el último cuarto de agua, mezclando completamente. Si durante la mezcla y aplicación hay presencia de espuma, se puede añadir un agente antiespumante para prevenirla.

METODOS DE APLICACIÓN:

Es importante que al utilizar NEMAREX® como nematicida, el producto este bien incorporado al suelo. Se puede hacer esto incorporándolo mecánicamente en la marca, o mediante el sistema de riego por goteo, aspersión o rodado.

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis (Lt/ha)	UAC (Dosis)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	5.0 - 5.5	0	0

UAC: 0 días. LMR: Cero residuos por ser un producto de naturaleza orgánica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar tres aplicaciones de NEMAREX® con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. Aplicar de manera preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, nutrientes foliares, reguladores de crecimiento o fungicidas siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y diluciones indicadas en esta etiqueta.

2.85 cm

PANTONES

Orla



Franja toxicológica



Logotipo



pantone
TypoGraphica
C:39 M:24 Y:23 K:22

Logotipo Agro Micro Biotech

