

19 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: Cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. Evite el contacto con la piel.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.
- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa o forrajes.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacenese en un lugar seguro, bajo llave; a la sombra, protegido de la intemperie.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito, beba grandes cantidades de agua limpia, busque ayuda médica e informe la naturaleza ácida de este producto.
 - En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
 - En caso de contacto con la piel, para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.
 - Antídoto: No hay antídoto específico.
- DL 50 Oral: >2000 mg/Kg I DL 50 Dermal: >4000 mg/Kg
Teléfonos de emergencia: ESSALUD: 080110200; Oficina Agro Micro biotech S.A.C.: (511) 368-3531.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Lavar los envases con agua limpia y usar esa solución junto con la mezcla inicial, además no olvidar de perforar los envases y disponerlos en puntos de acopio autorizados.

NOTA AL COMPRADOR

Agro Micro Biotech S.A.C. garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. Sí se usa y se maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
AGRO MICRO BIOTECH S.A.C.
Av. La Molina N° 3557
Oficina 302 Urb. El Sol de la Molina
Lima - Perú
Telef.: (511) 368-351
www.AgroMicroBioTech.com
Formulador:
BIO HUMA NETICS INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233
Telef.: +01 480 961 1220
E.E.U.U

Contenido Neto: 1040 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO


Natumillo®

ACEITE DE TOMILLO

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

ACEITE DE TOMILLO 56 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro N° XXX - SENASA - PBA - EV



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aplique NATUMILLO® siempre con un mínimo de 250 litros de agua en aplicación foliar. Utilice el producto en dosis bajas cuando el nivel de infestaciones sea bajo o si se utiliza de manera preventiva y la dosis alta cuando la infestación sea elevada (ver cuadro).
- Siempre use suficiente agua para asegurar buen cubrimiento de la aplicación pero tratando de evitar escurrimiento en las hojas. Nunca aplicar más de 1% de aceite en la mezcla.

SISTEMA DE REPARACIÓN Y APLICACIÓN INSTRUCCIONES DE MEZCLA:

- Siempre calibre su equipo de aplicación. Agite vigorosamente el producto antes de utilizar y la mezcla una vez que haya realizado. Para preparar la mezcla, tiene el tambor a 3 cuartos de la capacidad de agua, agregue el producto, y termine de verter el último cuarto de agua, mezclando completamente. Si durante la mezcla y aplicación hay presencia de espuma, se puede añadir un agente antiespumante para prevenirla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Es importante que al utilizar NATUMILLO® como fungicida preventivo o curativo que el producto entre en contacto con el 100% de la superficie de la hoja. Para mejor efectividad, aplíquese por la mañana o al atardecer. No se aplique en condiciones de lluvia, viento, con altas temperaturas o con estrés hídrico.

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis (Lt/ha)	UAC (Dosis)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Mildiu	Plasmopora vitícola	1.0 - 2.0	0	0
Vid	Oidium	Uncinula necator	1.0 - 2.0	0	0

UAC: 0 días. LMR: Cero residuos por ser un producto de naturaleza orgánica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar tres aplicaciones de NATUMILLO® con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando una campaña al año. Aplicar de manera preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 12 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, nutrientes foliares, reguladores de crecimiento o fungicidas siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y diluciones indicadas en esta etiqueta.

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS"




**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"



2.85 cm