

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado, evite el contacto con la piel y ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casas de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no induzca el vómito, acuda inmediatamente a la unidad de salud más cercana.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

STRACTA®
Origanum

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Extracto de orégano 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° XXX-SENASA-PBA-EV



Titular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores.
Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 20 L
N° de Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

Formulado por:
NEOAGRUM S.A.C.
Pj. Camino de Acceso N° 02
Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

STRACTA® ORIGANUM, es un fungicida natural de contacto, a base de extracto de orégano, eficaz para inhibir hongos fitopatógenos. Daña gravemente la morfología del micelio y tiene efectos sobre la membrana celular. Afecta la actividad de la oxidoreductasa, promueve la acumulación de especies reactivas de oxígeno y la producción de malondialdehído, lo que provoca la peroxidación lipídica, conduce a la destrucción de la permeabilidad e integridad de la membrana celular y finalmente provoca la muerte celular.

Modo de empleo: Aspersión foliar con cualquier equipo de aplicación terrestre dirigido hacia la zona donde se encuentra la plaga. Realice previamente la calibración del equipo a utilizar.

Llene el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis indicada del producto con los agitadores en movimiento complementando luego el agua restante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arándano	Oidiosis	<i>Erysiphe sp.</i>	0.6 - 1.0	NA	NA
Mandarina	Cladosporium	<i>Cladosporium sp.</i>	0.5 - 1.0	NA	NA

P.C.: Periodo de carencia

NA: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ARÁNDANO: Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de Floración-Fructificación y Desarrollo del fruto. Se recomienda realizar de (02) a más aplicaciones por campaña (01 al año), con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la enfermedad.
MANDARINA: Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo, sobre todo en la etapa de Desarrollo del fruto y Fructificación. Se recomienda realizar de (02) a más aplicaciones por campaña (01 al año), con una frecuencia de 7 días previa evaluación de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 12 horas después de la aplicación. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

STRACTA®ORIGANUM es compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

14,5 ± 0,3

2,2



Medidas en cm