

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa ligera irritación a la piel. Evitar el contacto del producto a la ropa o piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Triazol**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ETIQUETA PARA

Titular del Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores.

Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 4 L

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.

Nanjing 211100 CHINA.

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

S-PRONTO® 100 EC es un fungicida triazol, sistémico con acción curativa y preventiva; empleado en el control de hongos. Presenta un movimiento sistémico ascendente a través del xilema de las plantas conjuntamente con el agua y los elementos minerales absorbidos.

S-PRONTO® 100 EC es utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades en cultivos como espárrago.

S-PRONTO® 100 EC actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir, la dimetilación de los esteroides, provocando un crecimiento fungal anormal y posteriormente la muerte.

S-PRONTO® 100 EC se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua.

S-PRONTO® 100 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor).

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	L/ha		
AJO	Roya	Puccinia allii	200	-	7	0.02
ALCACHOFA	Oidium	Leveillula taurica	200	-	7	0.01
ARROZ	Quemado del arroz	Pyricularia oryzae	300	-	14	0.02
CAFÉ	Roya del café	Hemileia vastatrix	200	-	7	0.05
CEBOLLA	Punta seca	Stemphylium vesicarium	200	-	14	0.02
ESPÁRRAGO	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	250	0.75	14	0.02
GRANADILLA	Alternaria	Alternaria passiflorae	150-200	14	14	0.01
PIMIENTO	Oidiosis	Leveillula taurica	200	-	7	0.01
VID	Oidiosis	Uncinula necator	-	0.5	7	0.1
ZAPALLO	Oidium	Erysiphe cichoracearum	125	-	14	0.01

P.C.: Período de Carenacia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. En espárrago se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar ante los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

S-PRONTO® 100 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Medidas en cm

Envase: COEX