

500g

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# METEDIN

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición  
Clothianidin ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:  
RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C  
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: (511) 639-9311



FORMULADOR:  
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.  
Binhai Economic Development Area Weifang,  
Shandong 262737, China.  
Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231  
E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com  
<https://www.rainbowagro.com/>

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
SOLANDINA PERU S.A.C.  
Av. Alfredo Benavides N° 2150, Int. 702  
Urb. El Rosedal, Miraflores, Lima - Perú.  
Teléfono: +51 992 763 127

Contenido neto: 500 g  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

260 mm

180 mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Neonicotinoide

- Acudir al centro hospitalario inmediatamente y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- Este producto no tiene antídoto específico.
- El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106  
 RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 678-9544

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el aérea tratada.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**METEDIN** es un insecticida sistémico del grupo Neonicotinoide. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **METEDIN** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente. complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente. Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo  | Plaga                                 |                                 | Dosis   |          | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|          | N. Común                              | N. científico                   | Kg/200L | Kg/ha    |           |           |
| Tomate   | Mosquilla de los brotes               | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | -       | 0.4-0.5* | 14        | 0.05      |
| Arroz    | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes orizicolus</i>     | 0.15    | -        | 7         | 0.5       |
| Vid      | Cochinilla harinosa                   | <i>Planococcus citri</i>        | -       | 1.0      | 21        | 0.7       |
| Arándano | Cochinilla harinosa                   | <i>Planococcus citri</i>        | -       | 0.4-0.5  | 21        | 0.07      |

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

\* Usar la menos dosis cuando se presente baja presencia de la plaga y la dosis más alta cuando se presenten mayores valores de infestación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar dos aplicaciones de **METEDIN** por campaña. La primera aplicación se debe realizar entre los 30 y 40 días del trasplante, dependiendo de la variedad de tomate, población de la plaga y el clima reinante. La segunda aplicación se realizará a los diez días posteriores, en el cultivo de tomate.  
 Para el cultivo de vid aplicar el producto previa evaluación del campo, al observar la presencia de la plaga, realizar máximo dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**METEDIN** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



260 mm

180 mm